



Acis nicaeensis



Foto: Harrie de Vries

Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Acis* is afgeleid van de figuur Acis uit de Griekse mythologie, een herder en de geliefde van de nimf Galatea, die door de cyclop Polyfemus werd verpletterd en veranderde in een rivier. De naam werd in 2004 nieuw leven ingeblazen toen het geslacht *Leucojum* (lenteklokje) werd opgesplitst, waarbij de soorten die in het voorjaar bloeien naar *Acis* werden verplaatst. De soortaanduiding *nicaeensis* betekent 'van Nice', verwijzend naar de stad Nice in Frankrijk, de regio waar de plant van nature voorkomt. Er is geen algemene Nederlandse naam voor deze specifieke soort.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com
Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com
Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl
Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Taxonomie

De taxonomische indeling van *Acis nicaeensis* is als volgt:

- Rijk: *Plantae* (Planten)
- Orde: *Asparagales*
- Familie: *Amaryllidaceae* (Narcisfamilie)
- Onderfamilie: *Amaryllidoideae*
- Tribus: *Galantheae*
- Geslacht: *Acis*
- Soort: *Acis nicaeensis*

Synoniemen

Vanwege de relatief recente herclassificatie is het meest bekende en gebruikte synoniem *Leucojum nicaeense*. De soort is lang onder deze naam bekend geweest.

Variëteiten en Cultivars

Acis nicaeensis is een zeldzame en delicate plant die voornamelijk in zijn botanische vorm wordt gekweekt, vaak door verzamelaars en liefhebbers van alpen- en rotsplanten.

Variëteiten en Cultivars

- Er zijn geen algemeen erkende of commercieel verhandelde variëteiten (*varietates*) of cultivars van *A. nicaeensis* in de traditionele zin. De plant wordt vrijwel uitsluitend als de zuivere soort gekweekt.
- De natuurlijke populaties vertonen enige, maar geringe, variatie in bloemgrootte en bloeitijd, maar deze zijn niet geformaliseerd in namen.
- De focus bij deze soort ligt op het behoud van de zuivere wilde vorm.

Familie

Acis nicaeensis behoort tot de familie *Amaryllidaceae* (Narcisfamilie). Dit is dezelfde familie als die van de bekende Narcis (*Narcissus*), Sneeuwklokje (*Galanthus*) en Lenteklokje (*Leucojum*), waar het geslacht *Acis* van is afgesplitst.

Hoogte

Dit is een zeer kleine bolgewas. De volwassen hoogte van *Acis nicaeensis* bedraagt doorgaans slechts 8 tot 15 centimeter.

Bloemkleur

De bloemen zijn zuiver wit. Ze zijn klokvormig, staan op slanke stelen en missen de groene of gele vlekken aan de tippen van de bloemblaadjes die kenmerkend zijn voor de verwante *Leucojum* (Lenteklokje) soorten.

Bladkleur

De bladeren zijn smal, draadachtig, en helder groen van kleur. Ze verschijnen tegelijkertijd met of kort voor de bloei en zijn slechts enkele millimeters breed.



Bloeiperiode

De bloeiperiode valt in het vroege voorjaar, meestal van maart tot april, afhankelijk van de lokale omstandigheden. Het is een vroege bloeier.

Standplaats

De plant vereist een zonnige tot licht beschaduwde standplaats. De bodem moet zeer goed doorlatend zijn en droog in de zomer, de rustperiode van de bol. Het gedijt goed in rotstuinen, op hellingen of in potten met een grindachtige, kalkrijke bodem.

Herkomst

Acis nicaeensis is endemisch in een zeer klein gebied rond de stad Nice en Monaco in de Zuid-Franse en Noordwest-Italiaanse Alpen (de Maritieme Alpen). Het groeit op droge, rotsachtige kalkstenen hellingen dicht bij de kust.

Soort gewas

Het is een overblijvende, bolvormige geofyt. Het wordt beschouwd als een gespecialiseerde rotsplant, geschikt voor alpenkassen of zeer beschermde plekken in de rotstuin.

Vermeerderingswijze

De meest gebruikelijke vermeerderingswijze is door middel van zaad. Het zaad moet vers gezaaid worden. De plant vormt zelden grote klusters van broedbollen, waardoor zaaien de geprefereerde methode is voor de kwekers.

Klimaatzone (USDA-zones)

Acis nicaeensis is over het algemeen winterhard in USDA hardheidszones 7 tot 9. Het tolereert lichte tot matige vorst, maar de grootste bedreiging is de combinatie van kou en nattigheid in de winter, en de vereiste droge, hete zomer.

Insecten

Net als andere vroegbloeiende bolgewassen, dienen de bloemen als een vroege nectarbron voor bijen en andere kleine, vroeg actieve bestuivende insecten. De plant wordt niet geassocieerd met specifieke ernstige plagen.

Bronvermelding

<http://www.kew.org/science/knowledge/plants-and-fungi/plants-of-the-world-online/Acis-nicaeensis>

<https://www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/Acis>

<https://www.rhs.org.uk/plants/90262/Acis-nicaeensis/details>



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	<i>Acis</i> (vernoemd naar de mythische figuur Acis); <i>nicaeensis</i> (van Nice, Frankrijk). Geen algemene Nederlandse naam.
Taxonomie	Rijk: <i>Plantae</i> , Clade: Monocotylen, Orde: <i>Asparagales</i> , Familie: <i>Amaryllidaceae</i> , Geslacht: <i>Acis</i> , Soort: <i>Acis nicaeensis</i> .
Synoniemen	<i>Leucojum nicaeense</i> .
Variëteiten en Cultivars	Geen erkende variëteiten of cultivars; wordt uitsluitend als de botanische soort gekweekt.
Familie	<i>Amaryllidaceae</i> (Narcisfamilie).
Hoogte	8 tot 15 centimeter.
Bloemkleur	Zuiver wit.
Bladkleur	Helder groen.
Bloeiperiode	Maart tot april (vroeg voorjaar).
Standplaats	Zonnig tot lichte schaduw, zeer goed doorlatende, kalkrijke grond, droog in de zomer.
Herkomst	Zuid-Frankrijk en Noordwest-Italië (rond Nice en Monaco).
Soort gewas	Overblijvende, bolvormige geofyt, rotsplant.
Vermeerderingswijze	Zaad (vers zaaien).
Klimaatzone (USDA-zones)	7 tot 9.
Insecten	Vroege nectarbron voor bijen en bestuivende insecten.