



Aconitum carmichaelii 'Arendsii'

Nomenclatuur en Etymologie

Aconitum carmichaelii 'Arendsii' is een cultivar van de soort *Aconitum carmichaelii*, ook wel bekend als monnikskap. De soortnaam *carmichaelii* is ter ere van de Schotse plantkundige Carmichael, die de plant ontdekte in China. De cultivarnaam 'Arendsii' verwijst naar de Duitse kweker Georg Arends, die deze specifieke selectie heeft gekweekt.

Taxonomie

- Rijk: Plantae (Planten)
- Orde: Ranunculales
- Familie: Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)
- Geslacht: *Aconitum*
- Soort: *Aconitum carmichaelii*
- Cultivar: *Aconitum carmichaelii* 'Arendsii'

Synoniemen

Er zijn geen gangbare synoniemen bekend voor *Aconitum carmichaelii* 'Arendsii', aangezien het een erkende cultivar is zonder alternatieve benamingen.

Eventuele Variëteiten

Naast 'Arendsii' zijn er andere cultivars van *Aconitum carmichaelii*, zoals 'Barker's Variety' en 'Kelmscott'.

Familie

Aconitum carmichaelii 'Arendsii' behoort tot de familie *Ranunculaceae*, ook bekend als de ranonkelfamilie.

Hoogte

Deze plant kan een hoogte bereiken van 100 tot 150 centimeter.

Bloemkleur

De bloemen van *Aconitum carmichaelii* 'Arendsii' zijn diep blauw tot paars van kleur.

Bladkleur

De bladeren zijn donker groen en hebben een handvormige, diep ingesneden structuur.

Bloeiperiode

Aconitum carmichaelii 'Arendsii' bloeit in de late zomer tot de vroege herfst, van augustus tot oktober.

Standplaats

Deze plant gedijt goed in vochtige, goed doorlatende grond en prefereert een standplaats in de halfschaduw tot volle zon.

Herkomst

Aconitum carmichaelii is oorspronkelijk afkomstig uit Oost-Azië, met name uit China en Mongolië. De 'Arendsii' cultivar is ontwikkeld in Duitsland.

Soort Gewas

Aconitum carmichaelii 'Arendsii' is een vaste plant.

Vermeerderingswijze

Deze plant kan worden vermeerderd door deling in het voorjaar of door zaaien.

Klimaatzone

Aconitum carmichaelii 'Arendsii' gedijt het beste in gematigde klimaatzones, specifiek USDA zones 3-7.

Insecten

De bloemen van *Aconitum carmichaelii* 'Arendsii' trekken bestuivende insecten aan, zoals bijen en vlinders. Het is echter belangrijk op te merken dat alle delen van de plant giftig zijn.

Bronvermelding

- Royal Horticultural Society: *Aconitum carmichaelii* 'Arendsii'. (bron: <https://www.rhs.org.uk/plants/87858/aconitum-carmichaelii-arendsii/details>)
 - Missouri Botanical Garden: *Aconitum carmichaelii* 'Arendsii'. (bron: <https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=263130>)
-



Samenvatting

Aspect	Details
Wetenschappelijke naam	<i>Aconitum carmichaelii</i> 'Arendsii'
Synoniemen	Geen
Variëteiten	'Barker's Variety', 'Kelmscott'
Familie	Ranunculaceae
Hoogte	100-150 centimeter
Bloemkleur	Diep blauw tot paars
Bladkleur	Donker groen
Bloeiperiode	Augustus - oktober
Standplaats	Vochtige, goed doorlatende grond, halfschaduw tot volle zon
Herkomst	Oost-Azië (China, Mongolië), ontwikkeld in Duitsland
Soort Gewas	Vaste plant
Vermeerderingswijze	Deling, zaaien
Klimaatzone	USDA zones 3-7
Insecten	Bijen, vlinders