



Adenophora tashiroi



Foto: Peter Hellings

Nomenclatuur/etymologie

De geslachtsnaam *Adenophora* is afgeleid van de Griekse woorden adeen (klier) en phoros (dragend), een verwijzing naar de klierachtige nectarring (*nectariferous disc*) aan de basis van de stamper, wat een kenmerk is om dit geslacht te onderscheiden van *Campanula*. De soortaanduiding *tashiroi* is een eerbetoon aan de Japanse botanicus en verzamelaar Zen'ei Tashiro (1871–1939), die de plant voor het eerst verzamelde en beschreef in de vroege 20e eeuw.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com
Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com
Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl
Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Taxonomie

- Rijk: Plantae
- Stam: Tracheophyta
- Klasse: Magnoliopsida
- Orde: Asterales
- Familie: Campanulaceae
- Geslacht: *Adenophora*
- Soort: *Adenophora tashiroi*

Synoniemen

Adenophora tashiroi is de botanisch geaccepteerde naam voor deze specifieke soort. Vanwege het relatief beperkte geografische verspreidingsgebied en het feit dat de plant voornamelijk door gespecialiseerde kwekers wordt verzameld, zijn er geen algemeen bekende of frequent gebruikte botanische synoniemen. De soort is nauw verwant aan andere Oost-Aziatische *Adenophora*-soorten, maar wordt als een aparte taxon beschouwd.

Variëteiten en cultivars

Adenophora tashiroi is een zeldzame en botanisch interessante soort en wordt in de sierteelt vrijwel uitsluitend als de wilde soort gekweekt. Er zijn geen specifieke benaamde variëteiten of cultivars van deze plant bekend die in de gangbare handel worden aangeboden. Liefhebbers kweken de plant puur om de botanische kenmerken en de subtiele kleur.

Familie

De plant behoort tot de familie Campanulaceae, oftewel de klokjesbloemfamilie. Deze familie omvat planten die doorgaans klok- of trechtervormige bloemen produceren. Binnen deze familie staat het geslacht *Adenophora* bekend als de 'Ladybells', ter onderscheiding van de 'Bellflowers' (*Campanula*). De meeste soorten binnen de Campanulaceae hebben wit melksap.

Hoogte

Adenophora tashiroi is een middelgrote vaste plant met een elegante, slanke groei. De bloestengels bereiken een hoogte van ongeveer 40 tot 70 centimeter. De plant groeit rechtop en vormt een compacte pol van wortelbladeren.

Bloemkleur

De bloemen zijn opvallend lichtblauw tot zacht lavendelpaars. Ze zijn klokvormig, hangen aan slanke steeltjes en staan in een losse, aarachtige tros aan het einde van de stengels. De bloemen zijn vaak groter en breder open dan bij veel andere *Adenophora*-soorten.

Bladkleur

Het blad van de plant is donkergroen. De bladeren zijn lancet- tot ovaalvormig en hebben fijn gezaagde randen. Ze zijn afwisselend langs de stengel geplaatst, hoewel de bladeren onderaan de stengel vaak groter en dichter bij elkaar staan. Het loof heeft een fris en gezond uiterlijk.



Bloeiperiode

De bloeiperiode van deze plant valt in de late lente en de vroege zomer. *Adenophora tashiroi* bloeit doorgaans van juni tot en met juli. Dit is een relatief vroege bloei in vergelijking met sommige andere klokjesbloemen.

Standplaats

Deze soort gedijt goed op een standplaats in de volle zon tot lichte halfschaduw. De plant heeft een uitstekende drainage nodig; stagnerend vocht, vooral in de winter, is funest vanwege de penwortel. De bodem moet humusrijk, neutraal tot licht alkalisch zijn.

Herkomst

Adenophora tashiroi is inheems in Oost-Azië. Het is een endemische plant van de Koreaanse schiereilanden en komt daar voor in bergachtige gebieden, vaak op rotsachtige hellingen en open, goed gedraineerde plaatsen. De herkomst duidt op de behoefte aan een koel en goed geventileerd milieu.

Soort gewas

Het betreft een kruidachtige, overblijvende vaste plant. De plant wordt gewaardeerd als een sierlijke plant voor de border, de rotstuin of als botanische rariteit. Net als andere *Adenophora*-soorten vormt de plant een diepe penwortel, wat verplanting of scheuren bemoeilijkt.

Vermeerderingswijze

De meest geschikte methode om deze plant te vermeerderen is door zaaien. De zaden moeten in het vroege voorjaar worden gezaaid. Vanwege de penwortel is deling van de pol sterk af te raden. Als de plant eenmaal is gevestigd, is het beter om deze ongemoeid te laten.

Klimaatzone


Adenophora tashiroi is goed winterhard en valt in USDA Klimaatzone 4 tot 7. De plant is bestand tegen de koude winters van de gematigde zones, mits de essentiële eis van goede drainage in de winter wordt gewaarborgd.

Insecten

De klokvormige bloemen zijn een bron van voedsel voor bijen en hommels, die de primaire bestuivers zijn. De plant wordt over het algemeen als robuust beschouwd. Enige voorzichtigheid is geboden met slakkenvraat aan de jonge, uitlopende scheuten in het voorjaar, maar ernstige ziekten of plagen zijn zeldzaam.

Bronvermelding

<https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:139634-1>



Samenvatting

Onderwerp	Details
Nomenclatuur/etymologie	<i>Adenophora</i> (klierdragend), <i>tashiroi</i> (eerbetoon aan botanicus Tashiro).
Taxonomie	Rijk: Plantae, Familie: Campanulaceae, Geslacht: <i>Adenophora</i> .
Synoniemen	Geen gangbare, geaccepteerde synoniemen.
Variëteiten en cultivars	Geen cultivars bekend; wordt als botanische soort gekweekt.
Familie	Campanulaceae (Klokjesbloemfamilie).
Hoogte	40- 70 cm.
Bloemkleur	Lichtblauw tot zacht lavendelpaars (klokvormig).
Bladkleur	Donkergroen.
Bloeiperiode	Juni- juli (late lente/vroege zomer).
Standplaats	Zon tot lichte halfschaduw, zeer goed gedraineerde, humusrijke grond.
Herkomst	Oost-Azië (Koreaanse schiereilanden).
Soort gewas	Kruidachtige vaste plant (met penwortel).
Vermeerderingswijze	Zaaien.
Klimaatzone	Zone 4-7 (Winterhard).
Insecten	Bijen en hommels; gevoelig voor slakkenvraat in het voorjaar.