



Akebia quinata

Nomenclatuur/Etymologie

De botanische naam *Akebia quinata* is afkomstig van de Japanse naam voor de plant, Akebi (通草), en de Latijnse term *quinata*, wat 'vijfvoudig' betekent. Dit laatste verwijst naar de kenmerkende vijftallige bladeren van de plant.

Taxonomie

- Rijk: Plantae
- Klasse: Magnoliopsida
- Orde: Ranunculales
- Familie: Lardizabalaceae
- Geslacht: *Akebia*
- Soort: *Akebia quinata*

Synoniemen

Enkele bekende synoniemen voor *Akebia quinata* zijn *Akebia micrantha*, *Akebia quinata* var. *lancifolia*, *Akebia quinata* var. *longisepala*, en *Akebia quinata* var. *ternata*.

Variëteiten en Cultivars

Naast de hoofdvorm *Akebia quinata* bestaan er variëteiten en cultivars met specifieke kenmerken.

- 'Alba': Een cultivar met zuiver witte bloemen in plaats van de paarsbruine.
- 'Rosea': Een cultivar die lichtroze tot roze bloemen produceert.
- 'Silver Bells': Een cultivar met crèmekleurige bloemen die een zilverachtige gloed hebben.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com

Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com

Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>



Foto: Harrie de Vries

- 'Cream de la Cream': Een cultivar met romig witte bloemen die een sterke, kruidige geur afgeven.
- 'Shiro-Jubun': Een cultivar met grote, witte bloemen die een zoete geur verspreiden.
- 'Variegata': Een cultivar met bonte bladeren, waarbij de bladranden vaak crèmekleurig of geelwit zijn.
- 'Purple Bells': Een cultivar die, zoals de naam al suggereert, dieppaarse klokvormige bloemen heeft.

Familie

Akebia quinata behoort tot de familie Lardizabalaceae. Dit is een kleine familie van bloeiende planten die voornamelijk in Oost-Azië en de Himalaya voorkomt. De familie staat bekend om zijn klimmende planten met handvormig samengestelde bladeren.

Hoogte

Akebia quinata is een krachtige klimmer die een hoogte kan bereiken van **6 tot 12 meter**. Door de snelle groei kan de plant grote oppervlakken bedekken, zoals muren, pergola's en hekken.

Bloemkleur

De bloemen van *Akebia quinata* zijn meestal paarsbruin tot diep violet, met een opvallende chocoladegeur. De vrouwelijke bloemen zijn groter dan de mannelijke.

Bladkleur

Het blad van *Akebia quinata* is over het algemeen heldergroen, hoewel sommige cultivars bonte bladeren hebben. De bladeren zijn handvormig samengesteld uit vijf deelblaadjes.

Bloeiperiode

De bloeiperiode van *Akebia quinata* valt in het voorjaar, meestal van april tot mei. Na de bloei kunnen eetbare vruchten verschijnen die op worstjes lijken.

Standplaats

Deze plant gedijt het beste in de volle zon tot halfschaduw. Een beschutte standplaats wordt aanbevolen om de bloei te bevorderen en om jonge planten te beschermen tegen strenge vorst. De plant kan in de schaduw groeien, maar zal dan minder bloemen en vruchten produceren.

Herkomst

Akebia quinata is inheems in Oost-Azië, waaronder China, Japan en Korea. In Japan is de plant bekend onder de naam Akebi en worden de vruchten gegeten.

Soort Gewas

Akebia quinata is een bladverliezende, houtige klimplant. Het is een tweehuizige plant, wat betekent dat mannelijke en vrouwelijke bloemen zich op verschillende planten bevinden, hoewel sommige cultivars eenhuizig zijn en zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen op één plant dragen.



Vermeerderingswijze

De plant kan op verschillende manieren vermeerderd worden:

- Stekken: Zowel in de zomer als de winter is het mogelijk om stekken te nemen.
- Afleggen: Een tak van de plant wordt naar de grond gebogen en begraven totdat er wortels gevormd zijn.
- Zaaïen: De zaden kunnen in het najaar gezaaid worden.

Klimaatgebied (USDA-zones)

Akebia quinata is geschikt voor USDA-zones 4 tot 8. Dit betekent dat de plant goed bestand is tegen koude winters en temperaturen tot ongeveer -34°C kan verdragen.

Insecten

De bloemen van *Akebia quinata* trekken verschillende insecten aan, met name bijen en vlinders, die helpen bij de bestuiving. De plant is relatief resistent tegen de meeste plagen en ziekten.

Bronvermelding

- <https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=281867>
 - <https://www.rhs.org.uk/plants/689/akebia-quinata/details>
 - <https://plants.ces.ncsu.edu/plants/akebia-quinata/>
 - <https://garden.org/plants/view/63891/Akebia-quinata/>
-

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	<i>Akebia</i> van Japanse naam Akebi, <i>quinata</i> van Latijn voor 'vijfvoudig'
Taxonomie	Rijk: Plantae, Klasse: Magnoliopsida, Orde: Ranunculales, Familie: Lardizabalaceae, Geslacht: <i>Akebia</i> , Soort: <i>Akebia quinata</i>
Synoniemen	<i>Akebia micrantha</i> , <i>Akebia quinata</i> var. <i>lancifolia</i> , <i>Akebia quinata</i> var. <i>longisepala</i> , <i>Akebia quinata</i> var. <i>ternata</i>
Variëteiten en Cultivars	'Alba', 'Rosea', 'Silver Bells', 'Cream de la Cream', 'Shiro-Jubun', 'Variegata', 'Purple Bells'
Familie	Lardizabalaceae
Hoogte	6 tot 12 meter
Bloemkleur	Paarsbruin tot diep violet
Bladkleur	Heldergroen (bonte bladeren bij cultivars)
Bloeiperiode	April tot mei
Standplaats	Volle zon tot halfschaduw
Herkomst	Oost-Azië (China, Japan, Korea)
Soort Gewas	Bladverliezende, houtige klimplant
Vermeerderingswijze	Stekken, afleggen, zaaien
Klimaatgebied (USDA-zones)	4 tot 8
Insecten	Bijen en vlinders