



Anemone drummondii



Foto's: Harrie de Vries

Nomenclatuur/Etymologie

Anemone drummondii is vernoemd naar Thomas Drummond, een Schotse botanicus die in de 19e eeuw planten verzamelde in Noord-Amerika. Het geslacht *Anemone* is afgeleid van het Griekse woord *anemos*, wat "wind" betekent, verwijzend naar de kwetsbaarheid van de bloemen, die lijken te dansen in de wind.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com
Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com
Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl
Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Taxonomie

De taxonomische classificatie van *Anemone drummondii* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Stam: Magnoliophyta (Bedektzadigen)
- Klasse: Magnoliopsida (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Ranunculales
- Familie: Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)
- Geslacht: *Anemone*
- Soort: *Anemone drummondii*

Synoniemen

Enkele synoniemen voor *Anemone drummondii* zijn *Anemone baldensis* en *Anemone canadensis* var. *drummondii*. Deze namen worden soms gebruikt in oudere literatuur, maar zijn minder gangbaar.

Eventuele variëteiten en cultivars

Er zijn geen erkende variëteiten of cultivars van *Anemone drummondii* bekend. Deze soort komt in het wild voor en wordt meestal niet gecultiveerd in tuinbouw, behalve in gespecialiseerde collecties.

Familie

Anemone drummondii behoort tot de familie Ranunculaceae, ook wel de ranonkelfamilie genoemd. Deze familie omvat veel bekende tuinplanten, waaronder boterbloemen (*Ranunculus*) en monnikskapen (*Aconitum*).

Hoogte

Anemone drummondii is een relatief lage plant en bereikt doorgaans een hoogte van 15 tot 30 cm. Dit maakt de plant geschikt voor rotsachtige tuinen of als bodembedekker in wilde tuinen.

Bloemkleur

De bloemen van *Anemone drummondii* variëren van wit tot lichtroze. Ze hebben meestal een enkele rij bloembladen en een prominent geel centrum, wat de bloemen een delicate maar opvallende uitstraling geeft.

Bladkleur

Het blad van *Anemone drummondii* is donkergroen en diep ingesneden, met een typische loofstructuur die lijkt op die van andere leden van het geslacht *Anemone*. De bladeren vormen een aantrekkelijk tapijt wanneer de plant niet in bloei staat.

Bloeiperiode

Anemone drummondii bloeit in de late lente tot de vroege zomer, meestal van juni tot juli. De bloemen verschijnen vaak direct na het smelten van de sneeuw in alpine gebieden, waar de plant veel voorkomt.



Standplaats

Deze plant gedijt goed op zonnige tot licht beschaduwde locaties en geeft de voorkeur aan goed doorlatende, vochtige grond. *Anemone drummondii* groeit vaak in open graslanden, langs bosranden en op berghellingen, waar de bodem rotsachtig of zanderig is.

Herkomst

Anemone drummondii is inheems in de bergachtige regio's van Noord-Amerika, met name in het westen van de Verenigde Staten en Canada. De plant groeit op grote hoogten in alpine en subalpine gebieden, vaak in rotsachtige of grasachtige terreinen.

Soort gewas

Anemone drummondii is een vaste plant die in het wild voorkomt. Het is een belangrijke soort in alpine ecosystemen, waar het helpt de bodem te stabiliseren en bijdraagt aan de biodiversiteit van bergachtige landschappen.

Vermeerderingswijze

Deze plant wordt meestal vermeerderd door zaad. In de natuur verspreiden de zaden zich door de wind. Voor tuinvermeerdering kan *Anemone drummondii* ook worden verdeeld door wortelstokken in het vroege voorjaar of de late zomer.

Klimaatzone

Anemone drummondii is winterhard in USDA-klimaatzones 5 tot 7. De plant is goed aangepast aan koude klimaten en kan overleven in gebieden met harde winters en koele zomers, vooral in bergachtige streken.

Insecten

Anemone drummondii trekt diverse bestuivers aan, waaronder bijen en vlinders. Deze insecten spelen een belangrijke rol bij de bestuiving van de bloemen. De plant heeft doorgaans weinig last van plagen, maar kan soms worden bezocht door bladluizen.

Bronvermelding

- https://www.wildflower.org/plants/result.php?id_plant=ANDR
 - <https://plants.usda.gov/home/plantProfile?symbol=ANDR>
 - <https://www.rhs.org.uk/plants/details?plantid=2718>
-



Samenvatting

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur/Etymologie	<i>Anemone drummondii</i> , vernoemd naar Thomas Drummond, betekent "windbloem" in het Grieks.
Taxonomie	Plantae, Magnoliophyta, Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae, <i>Anemone</i> , <i>Anemone drummondii</i>
Synoniemen	<i>Anemone baldensis</i> , <i>Anemone canadensis</i> var. <i>drummondii</i>
Variëteiten/Cultivars	Geen erkende variëteiten of cultivars bekend
Familie	Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)
Hoogte	15-30 cm
Bloemkleur	Wit tot lichtroze, met een geel centrum
Bladkleur	Donkergroen, diep ingesneden
Bloeiperiode	Juni - juli
Standplaats	Zon tot halfschaduw, vochtige, goed doorlatende grond
Herkomst	Noord-Amerikaanse berggebieden, met name in het westen van de VS en Canada
Soort gewas	Vaste plant, wildgewas
Vermeerderingswijze	Zaad, wortelstokdeling
Klimaatzone	USDA-zones 5-7, winterhard in koude klimaten
Insecten	Aantrekkelijk voor bestuivers zoals bijen en vlinders

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com

Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com

Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>