




Anemone multifida



Foto's: Peter Hellings



Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Anemone* is afgeleid van het Griekse woord *ánemos*, wat 'wind' betekent, en is de oorsprong van de populaire Engelse volksnaam 'windflower'. Een andere mogelijke afleiding is van *Na'man*, de Semitische naam voor Adonis, wiens bloed volgens de mythologie rode anemonen deed ontstaan. Het soort-epitheton *multifida* is een Latijnse samenstelling en betekent letterlijk 'vele malen verdeeld' of 'diep ingesneden', verwijzend naar de sterk verdeelde bladeren van de plant. De Engelse volksnaam is 'Cut-leaf Anemone' of 'Globe Anemone'. De wetenschappelijke naam is in 1804 beschreven door Jean Poiret.

Taxonomie

- Rijk: *Plantae* (Planten)
- Clade: *Tracheophyta* (Vatenplanten)
- Clade: *Angiospermae* (Bedektzadigen)
- Clade: *Eudicots* (Echte tweezaadlobbigen)
- Orde: *Ranunculales*
- Familie: *Ranunculaceae* (Ranonkelfamilie)
- Geslacht: *Anemone*
- Soort: *Anemone multifida*

Synoniemen

De taxonomie van *Anemone* is historisch gecompliceerd en kent veel synoniemen. Voor *Anemone multifida* zijn enkele belangrijke synoniemen en verwante namen: *Anemone globosa*, *Anemone hudsoniana*, *Anemone magellanica*, en *Anemone lanigera*. De soort werd in het verleden soms ook in het geslacht *Pulsatilla* geplaatst, met name de variëteiten met lange, gepluimde vruchten (nootjes).

Eventuele variëteiten en cultivars

Anemone multifida is een zeer variabele soort, wat heeft geleid tot de benoeming van verschillende variëteiten, voornamelijk gebaseerd op geografische spreiding en bloemkleur.

Variëteiten zijn onder meer:

- *multifida* var. *multifida* (de meest verspreide vorm).
- *multifida* var. *saxicola* (ook wel 'red windflower' genoemd, beperkt tot het westen van het verspreidingsgebied).
- *multifida* var. *stylosa* (beperkt tot Utah en Arizona).
- *multifida* var. *tetonensis* (beperkt tot het bergachtige westen van de VS).

Er zijn ook enkele cultivars ontwikkeld, vaak geselecteerd op basis van een consistente bloemkleur of groeikracht, zoals:

- *Anemone multifida* 'Annabella Deep Rose' (met dieproze bloemen).
- *Anemone multifida* 'Rubra' (met rode bloemen, een selectie die overeenkomt met var. *saxicola*).
- *Anemone multifida* 'Major' (met grotere, crèmewitte tot gelige bloemen).
- *Anemone multifida* 'Major' (crèmewit).

Familie

De plant behoort tot de *Ranunculaceae*, de Ranonkelfamilie.

Hoogte

De hoogte van de plant varieert sterk afhankelijk van de variëteit en de standplaats, van 10 centimeter in rotsachtige, onbeschutte omgevingen tot 40-70 centimeter in vruchtbaardere omstandigheden. De meeste cultivars in de tuinbouw blijven rond de 25-40 centimeter.



Bloemkleur

De bloemkleur is zeer variabel, zelfs binnen de wilde populaties, en omvat wit, crèmewit, geelachtig, roze en rood. De bloemen hebben geen echte kroonbladen, maar vier tot acht (meestal vijf) bloembladachtige kelkbladen (*tepalen*), die aan de buitenzijde vaak een rode, blauwe of paarse tint vertonen, terwijl de binnenzijde lichter is.

Bladkleur

De bladeren zijn grijsgroen tot donkergroen, diep ingesneden en bedekt met lange, zijdeachtige of ruwe witte haren. Dit geeft de plant een karakteristieke, zachte textuur.

Bloeiperiode

De bloeiperiode valt in de late lente en vroege zomer, meestal van april tot juni.

Standplaats

Anemone multifida gedijt het beste op een zonnige standplaats tot lichte halfschaduw, zoals in een bosrand. De grond moet goed doorlatend zijn, voedselrijk en vochthoudend, hoewel de soort in zijn natuurlijke habitat ook drogere, rotsachtige of grindachtige bodems verdraagt. Hij wordt vaak aanbevolen voor rotstuinen of bosrandbeplanting.

Herkomst

De plant is wijdverspreid in Noord-Amerika, met een bereik van Alaska tot New York, en strekt zich uit tot in het zuiden van de Verenigde Staten (zoals Arizona en New Mexico). De soort komt ook voor in delen van Zuid-Amerika. Het is een inheemse soort van open, rotsachtige hellingen, droge bossen en alpenweiden.

Soort gewas

Het is een langlevende, overblijvende, kruidachtige plant (*vaste plant*) met een vertakkende wortelstok (*caudex*) en wortelstokken (*rizomen*).

Vermeerderingswijze

Vermeerdering kan zowel door zaad als vegetatief. De planten zaaien zichzelf gemakkelijk uit. Vegetatieve vermeerdering kan plaatsvinden door deling van de wortelstokken, en bij sommige variëteiten vormen de vruchten gepluimde akenen die door de wind worden verspreid, wat bijdraagt aan de verwildering.

Klimaatzone

USDA winterhardheidszones 3 tot 8 (met een winterhardheid tot ongeveer -30°C).

Insecten

Zoals de meeste *Anemone*-soorten is *Anemone multifida* een goede bron van stuifmeel en nectar. De open bloemen trekken diverse bestuivers aan, waaronder bijen en vliegen. Bestuiving geschiedt voornamelijk door insecten.

Bronvermelding:


<https://floranorthamerica.org/Anemone>

https://en.wikipedia.org/wiki/Anemone_multifida

<https://fineflowersinthevalley.us/species/anemone-multifida-cutleaf-windflower/>

<https://tuinseizoen.com/anemone-multifida/>

<https://esveld.nl/a/product/anemone-multifida-annabella-deep-rose/>



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	<i>Anemone</i> (van Grieks <i>ánemos</i> = wind); <i>multifida</i> (Latijn voor 'vele malen verdeeld', verwijst naar het blad).
Taxonomie	Rijk: <i>Plantae</i> , Familie: <i>Ranunculaceae</i> , Orde: <i>Ranunculales</i> , Geslacht: <i>Anemone</i> , Soort: <i>Anemone multifida</i> .
Synoniemen	<i>Anemone globosa</i> , <i>Anemone hudsoniana</i> , <i>Anemone magellanica</i> , <i>Anemone lanigera</i> .
Eventuele variëteiten en cultivars	Variëteiten: <i>A. multifida</i> var. <i>multifida</i> , <i>A. multifida</i> var. <i>saxicola</i> , <i>A. multifida</i> var. <i>stylosa</i> , <i>A. multifida</i> var. <i>tetonensis</i> . Cultivars: <i>A. multifida</i> 'Annabella Deep Rose', <i>A. multifida</i> 'Rubra', <i>A. multifida</i> 'Major'.
Familie	<i>Ranunculaceae</i> (Ranonkelfamilie).
Hoogte	10 tot 70 centimeter (meestal 25-40 centimeter in cultuur).
Bloemkleur	Zeer variabel: wit, crèmewit, geelachtig, roze en rood; vaak met een donkere tint aan de buitenzijde.
Bladkleur	Grijsgroen tot donkergroen, diep ingesneden en behaard.
Bloeiperiode	April tot juni (late lente/vroege zomer).
Standplaats	Volle zon tot lichte halfschaduw; goed doorlatende, voedselrijke en vochthoudende tot droge, rotsachtige grond.
Herkomst	Noord-Amerika (van Alaska tot New York, zuidwaarts tot Arizona) en delen van Zuid-Amerika.
Soort gewas	Overblijvende, kruidachtige plant (vaste plant) met wortelstokken.
Vermeerderingswijze	Zaad (verwildering), deling van de wortelstokken.
Klimaatzone (alleen usda-zones)	USDA zones 3 tot 8.
Insecten	Bestuivers, voornamelijk bijen en vliegen, worden aangetrokken door het stuifmeel en de nectar.