



Begonia palmata

Nomenclatuur en etymologie

De botanische naam *Begonia palmata* is samengesteld uit het geslachtsnaam *Begonia*, vernoemd naar Michel Bégon, een Franse botanicus en beschermheer van de botanie, en het soortepitheton *palmata*, wat 'handvormig' betekent. Dit verwijst naar de karakteristieke, handvormige bladeren van de plant.

Taxonomie

De taxonomische classificatie van *Begonia palmata* is als volgt:

- Rijk: Plantae
- Orde: Cucurbitales
- Familie: Begoniaceae
- Geslacht: *Begonia*
- Soort: *Begonia palmata*

Synoniemen

Bekende synoniemen voor *Begonia palmata* zijn onder andere *Begonia laciniata* en *Begonia bowringiana*. Deze namen zijn in het verleden gebruikt om variaties binnen de soort aan te duiden.



Foto: Piet Kok

Variëteiten en cultivars

Binnen *Begonia palmata* zijn diverse variëteiten en cultivars bekend:

- *Begonia palmata* var. *bowringiana* – een variëteit met glanzende bladeren, afkomstig uit China.
- *Begonia palmata* var. *crassisetulosa* – een variëteit met dicht behaarde bladeren, gevonden in Yunnan, China.
- *Begonia palmata* 'Tie Dye' – een cultivar met opvallende, bontgekleurde bladeren.
- *Begonia palmata* 'Emerald Ring' – een cultivar met groene bladeren en een lichtere ringvormige tekening.

Familie

Begonia palmata behoort tot de familie Begoniaceae, een familie van bloemplanten die voornamelijk voorkomt in tropische en subtropische gebieden. De familie staat bekend om haar sierlijke bladeren en bloemen.

Hoogte

De plant bereikt een hoogte van ongeveer 20 tot 90 centimeter, afhankelijk van de groeiomstandigheden.

Bloemkleur

De bloemen van *Begonia palmata* variëren van wit tot lichtroze en verschijnen in losse trossen.

Bladkleur

De bladeren zijn groen aan de bovenzijde en kunnen aan de onderzijde een roodachtige tint vertonen. Sommige cultivars hebben opvallende bladtekeningen met lichtere of donkere accenten.

Bloeiperiode

De bloeiperiode strekt zich uit van juni tot september, waarbij de bloemen gedurende de zomermaanden verschijnen.

Standplaats

Begonia palmata gedijt het best op een standplaats met halfschaduw tot schaduw en een vochtige, goed doorlatende bodem. De plant prefereert beschutte locaties, zoals bosranden of schaduwrijke tuinen.



Herkomst

De soort is inheems in Azië en komt voor in landen zoals India, Nepal, Bhutan, China, Myanmar, Thailand, Laos en Vietnam. Ze groeit op hoogtes variërend van 100 tot 3200 meter, vaak in vochtige, schaduwrijke omgevingen.

Soort gewas

Begonia palmata is een overblijvende, kruidachtige plant met een rhizomateuze groeiwijze. Ze wordt vaak toegepast als sierplant vanwege haar decoratieve bladeren en bloemen.

Vermeerderingswijze

De plant kan worden vermeerderd door zaad of door deling van de wortelstokken. Zaaien vereist een warme, vochtige omgeving en kan langzaam verlopen.

Klimaatzone (USDA-zones)

Begonia palmata is geschikt voor USDA-zones 9 tot 11. In koudere klimaten wordt ze vaak als kamerplant gehouden of overwinterd in een kas.

Insecten

De bloemen van *Begonia palmata* trekken diverse bestuivende insecten aan, waaronder bijen en vlinders, die bijdragen aan de bestuiving van de plant.

Bronvermelding

- https://en.wikipedia.org/wiki/Begonia_palmata
 - <https://www.rhs.org.uk/plants/88464/begonia-palmata/details>
 - https://begonia.wiki/index.php/Begonia_palmata
 - <https://www.naturalmedicinalherbs.net/herbs/b/begonia-palmata.php>
-

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur	<i>Begonia</i> vernoemd naar Michel Bégon; <i>palmata</i> betekent 'handvormig', verwijzend naar de bladvorm
Taxonomie	- Rijk: Plantae - Clade: Tracheophyta - Clade: Angiospermae - Clade: Eudicots - Orde: Cucurbitales - Familie: Begoniaceae - Geslacht: <i>Begonia</i> - Soort: <i>Begonia palmata</i>
Synoniemen	<i>Begonia laciniata</i> , <i>Begonia bowringiana</i>
Variëteiten en cultivars	<i>Begonia palmata</i> var. <i>bowringiana</i> (glanzend blad), <i>Begonia palmata</i> var. <i>crassisetulosa</i> (dicht behaard), 'Tie Dye' (bont blad), 'Emerald Ring' (groen met lichte rand)
Familie	Begoniaceae
Hoogte	20 tot 90 cm
Bloemkleur	Wit tot lichtroze
Bladkleur	Groen boven, roodachtig onder; sommige cultivars hebben opvallende bladtekening
Bloeiperiode	Juni tot september
Standplaats	Halfschaduw tot schaduw; vochtige, goed doorlatende bodem
Herkomst	Azië (India, Nepal, Bhutan, China, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam); 100–3200 m hoogte
Soort gewas	Kruidachtige, overblijvende rhizoomplant
Vermeerderingswijze	Zaad of deling van wortelstokken
Klimaatzone (USDA)	Zones 9–11
Insecten	Bestuivende insecten zoals bijen en vlinders