



Campanula bohemica

Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Campanula* is afgeleid van het Latijnse woord *campana*, wat 'klok' of 'bel' betekent, en het verkleinwoord suffix *-ula*. Dit verwijst naar de typische klok- of bekerachtige vorm van de bloemen van dit geslacht. De soortnaam *bohemica* is afgeleid van Bohemia, de Latijnse naam voor Bohemen, een historische regio in Tsjechië. Dit geeft de primaire regio van herkomst van de plant aan.

Taxonomie

- Domein: Eukaryota
- Rijk: Plantae
- Orde: Asterales
- Familie: Campanulaceae
- Geslacht: *Campanula*
- Soort: *Campanula bohemica*

Synoniemen

Historisch gezien is *Campanula bohemica* soms onjuist geclassificeerd of verward met nauw verwante soorten. Enkele bronnen noemen de volgende synoniemen of misidentificaties: *Campanula rotundifolia* subsp. *bohemica* (Schur) K.Malý, wat aangeeft dat het eerder als een ondersoort van de algemene *C. rotundifolia* werd beschouwd.



Foto: Harrie de Vries

Variëteiten en Cultivars

Van de soort *Campanula bohemica* zijn geen algemeen erkende of benoemde variëteiten bekend. Er zijn geen commercieel verkrijgbare cultivars van deze zeldzame, in de bergen inheemse soort gedocumenteerd, in tegenstelling tot de veel gekweekte soorten zoals *C. carpatica* of *C. portenschlagiana*. De plant wordt voornamelijk in botanische collecties of door gespecialiseerde alpine kwekers onder zijn pure soortnaam gehouden.

Familie

De soort *Campanula bohemica* behoort tot de Campanulaceae, de klokjesbloemfamilie. Deze familie omvat ongeveer 84 geslachten en meer dan 2000 soorten, waarvan de meesten kruidachtige planten zijn, die vooral voorkomen in gematigde streken van het noordelijk halfrond.

Hoogte

Campanula bohemica is een relatief kleine plant die typisch een hoogte bereikt van ongeveer 10 tot 30 centimeter. Het is een vaste plant met een losse, polvormende groeiwijze.

Bloemkleur

De bloemkleur van *Campanula bohemica* is meestal violetblauw tot lichtblauw. De bloemen zijn klokvormig en hangen vaak, net als veel andere *Campanula*-soorten.

Bladkleur

De bladeren hebben een matige groene kleur. Er is een onderscheid tussen de wortelbladeren, die niervormig tot hartvormig en gesteeld zijn, en de stengelbladeren, die smaller, lancetvormig en meestal zittend zijn.

Bloeiperiode

De bloeiperiode van *Campanula bohemica* valt in de zomer, typisch van juli tot en met augustus.

Standplaats

Deze plant gedijt het beste op een standplaats in de volle zon of lichte halfschaduw. De grond moet goed doorlatend zijn en een lichte voorkeur hebben voor een neutrale tot licht zure, rotsachtige, zandige of gruisachtige bodem, die het natuurlijke alpine habitat nabootst.

Herkomst

De herkomst van *Campanula bohemica* is endemisch voor de bergketens van Tsjechië, met name het Reuzengebergte (Krkonoše) en mogelijk ook de Hrubý Jeseník.

Soort Gewas

Het is een kruidachtige, overblijvende vaste plant.



Vermeerderingswijze

De primaire vermeerderingswijze voor *Campanula bohemica* is door zaad of door deling van de wortelstokken in het vroege voorjaar of najaar. Zaadvermeerdering vereist vaak een koude stratificatie om de kieming te bevorderen.

Klimaatzone (USDA-zones)

Op basis van de natuurlijke herkomst in bergachtige regio's met koude winters, wordt aangenomen dat *Campanula bohemica* geschikt is voor USDA-winterhardheidszones 4 tot 7.

Insecten

De bloemen van *Campanula bohemica* worden, net als andere klokjesbloemen, voornamelijk bestoven door bijen en hommels. De plant kan gevoelig zijn voor plagen zoals slakken en naaktslakken, vooral in vochtige omstandigheden, en soms voor bladluizen.

Bronvermelding

- <https://botany.cz/cs/campanula-bohemica/>
 - <https://flora-on-line.cz/campanula-bohemica/>
-

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	<i>Campanula</i> (Latijn: klokje) <i>bohemica</i> (uit Bohemen/Tsjechië)
Taxonomie	Rijk Plantae, Familie Campanulaceae, Geslacht <i>Campanula</i> , Soort <i>C. bohemica</i>
Synoniemen	<i>Campanula rotundifolia</i> subsp. <i>bohemica</i>
Variëteiten	Geen erkende variëteiten
Cultivars	Geen commercieel bekende cultivars
Familie	Campanulaceae (Klokjesbloemfamilie)
Hoogte	10 tot 30 centimeter
Bloemkleur	Violetblauw tot lichtblauw
Bladkleur	Groen
Bloeiperiode	Juli tot en met augustus
Standplaats	Volle zon tot lichte halfschaduw; goed doorlatende, rotsachtige of zandige grond
Herkomst	Endemisch voor het Reuzengebergte (Krkonoše), Tsjechië
Soort Gewas	Kruidachtige, overblijvende vaste plant
Vermeerderingswijze	Zaad (vaak met koude stratificatie) of Deling van wortelstokken
Klimaatzone (USDA-zones)	4 tot 7
Insecten	Bijen en hommels (bestuivers); slakken/naaktslakken en bladluizen (plagen)