



Campanula rumeliana



Foto: Peter Hellings

Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Campanula* is afgeleid van het Latijnse woord 'campana', wat 'klok' betekent, met het verkleinwoord achtervoegsel '-ula', wat samen 'campanula' of 'kleine klok' betekent. Dit verwijst naar de kenmerkende klokvorm van de bloemen. De soortnaam *rumeliana* is afgeleid van de historische regio Roemelië (Rumelia), een gebied op de Balkan dat een deel van het oorspronkelijke verspreidingsgebied van deze plant omvat. De soort werd voor het eerst in 1837 beschreven door Hampe, destijds onder de naam *Trachelium rumelianum*, en later in 1874 door Vatke overgebracht naar het geslacht *Campanula*.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com
Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com
Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl
Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Taxonomie

De taxonomische indeling van *Campanula rumeliana* is als volgt:

- Rijk: Plantae
- Orde: Asterales
- Familie: Campanulaceae
- Geslacht: *Campanula*
- Soort: *Campanula rumeliana*

Synoniemen

Vanwege de taxonomische geschiedenis van deze plant zijn er diverse synoniemen bekend. De meest relevante synoniemen zijn:

- *Trachelium rumelianum* Hampe
- *Diosphaera rumeliana* (Hampe) Bornm.
- *Campanula jacquinii* subsp. *rumeliana* (Hampe) Kit Tan
- *Diosphaera dubia* Friv. ex Buser
- *Phyteuma rumelicum* (Hampe) Griseb.
- *Trachelium jacquinii* subsp. *rumelianum* (Hampe) Tutin

Eventuele variëteiten en cultivars

De plant wordt in de meeste gevallen verhandeld als de botanische soort. Er zijn echter enkele taxonomische variaties en kleurafwijkingen bekend. Een bekende geografische of morfologische onderverdeling is *Campanula rumeliana* subsp. *chalcidica* (Buser) Greuter & Burdet. Hoewel er geen formeel geregistreerde cultivars op de markt zijn met brede verspreiding, is er een blekere vorm van de bloem, die neigt naar wit of zeer licht lavendel, waargenomen bij gekweekte exemplaren en soms informeel wordt aangeduid. De plant wordt meestal gewaardeerd om zijn oorspronkelijke alpiene vorm.

Familie

Campanula rumeliana behoort tot de familie **Campanulaceae**, de Klokjesfamilie.

Hoogte

Dit is een compacte, laagblijvende rotsplant die een bescheiden hoogte bereikt van 10 tot 15 cm. De plant groeit polvormig.

Bloemkleur

De bloemen hebben een intense, heldere kleur die varieert van blauw tot lavendelblauw of paarsachtig blauw. De bloemen zijn klokvormig en relatief groot, in verhouding tot de grootte van de gehele plant.

Bladkleur

De bladeren zijn groen. Ze zijn eivormig tot breed lancetvormig en vormen een dichte rozet aan de basis van de bloeistengels.



Bloeiperiode

De plant bloeit gedurende de zomer, met de piek bloeiend van juni tot augustus.

Standplaats

De plant is van nature een rotsplant en vereist een standplaats in de volle zon en een uitstekend doorlatende, steenachtige grond. Ze gedijt goed in rotstuinen, op grindbedden en in alpenbakken.

Herkomst

Campanula rumeliana is inheems in de Balkan, oftewel Zuidoost-Europa. De natuurlijke habitat bestaat uit rotsachtige hellingen en berggebieden in landen als Griekenland en Bulgarije.

Soort gewas

Het is een kruidachtige vaste plant (perennial). Het is een compacte rotsplant die een rozet vormt.

Vermeerderingswijze

De vermeerdering kan plaatsvinden door zaad. Het zaad kan het beste in het voorjaar of de vroege herfst worden gezaaid. Daarnaast kan de plant in de lente of herfst voorzichtig gedeeld worden.

Klimaatzone (USDA-zones)


Campanula rumeliana is winterhard en wordt geclassificeerd als geschikt voor de USDA-winterhardheidszones 4 tot 7.

Insecten

De bloemen van *Campanula rumeliana* trekken een verscheidenheid aan bestuivers aan, met name bijen, vanwege de nectarproductie. Het geslacht *Campanula* dient ook als voedselplant voor de larven van verschillende Lepidoptera, waaronder de Gewone Kuifvlinder (*Eupithecia subumbrata*) en de Puntlijnvinder (*Mythimna conigera*).

Bronvermelding

- <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:141014-1>
 - <https://www.gbif.org/species/5410787>
 - <https://plantlust.com/plants/38157/campanula-rumeliana/>
 - <https://www.greekflora.gr/el/flowers/1393/Campanula-rumeliana>
-



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	Genoemd naar de regio Roemelië (Balkan); <i>Campanula</i> is Latijn voor 'kleine klok'.
Taxonomie	Rijk: Plantae, Clade: Tracheophyta, Clade: Angiospermen, Clade: Eudicotyledonae, Clade: Asteriden, Orde: Asterales, Familie: Campanulaceae, Geslacht: <i>Campanula</i> , Soort: <i>Campanula rumeliana</i>
Synoniemen	<i>Trachelium rumelianum</i> Hampe, <i>Diosphaera rumeliana</i> (Hampe) Bornm., <i>Campanula jacquinii</i> subsp. <i>rumeliana</i> (Hampe) Kit Tan, <i>Diosphaera dubia</i> Friv. ex Buser, <i>Phyteuma rumelicum</i> (Hampe) Griseb., <i>Trachelium jacquinii</i> subsp. <i>rumelianum</i> (Hampe) Tutin
Eventuele variëteiten en cultivars	Variëteiten: <i>Campanula rumeliana</i> subsp. <i>chalcidica</i> . Bleke (bijna witte) bloemvorm waargenomen in cultuur. Geen algemeen geaccepteerde cultivars.
Familie	Campanulaceae (Klokjesfamilie)
Hoogte	10–15 cm
Bloemkleur	Helder blauw tot lavendelblauw of paarsachtig blauw
Bladkleur	Groen
Bloeiperiode	Zomer (juni-augustus)
Standplaats	Volle zon, goed doorlatende, steenachtige grond
Herkomst	Balkan (Zuidoost-Europa), waaronder Griekenland en Bulgarije
Soort gewas	Kruidachtige vaste plant, alpiene rotsplant
Vermeerderingswijze	Zaad of deling
Klimaatzone (USDA-zones)	USDA 4 tot 7
Insecten	Bijen (bestuivers); waardplant voor larven van diverse vlindersoorten (Lepidoptera)