



Campanula sartori




Foto: Harrie de Vries

Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Campanula* is afgeleid van het Latijnse woord *campana*, wat "klokje" betekent, en verwijst naar de klokvormige bloemen die kenmerkend zijn voor deze groep. De soortnaam *sartori* is een eerbetoon aan de Italiaanse botanicus Giovanni Sartori (1821–1862), die een belangrijke rol speelde bij de studie van de flora van Griekenland, waar deze plant voorkomt. De naamgeving is dus een patroniem.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com
Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com
Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl
Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Taxonomie

- Rijk: *Plantae* (Planten)
- Afdeling: *Tracheophyta* (Vaatplanten)
- Klasse: *Magnoliopsida* (Tweezaadlobbigen)
- Orde: *Asterales* (Asterachtigen)
- Familie: *Campanulaceae* (Klokjesfamilie)
- Geslacht: *Campanula* (Klokje)
- Soort: *Campanula sartori*

Synoniemen

Er zijn geen wijdverbreide of algemeen geaccepteerde botanische synoniemen voor *Campanula sartori* die vaak in de hedendaagse literatuur worden gebruikt. De naam *Campanula sartori* is de gevestigde naam voor deze soort.

Variëteiten en Cultivars

Campanula sartori is een zeldzame, gespecialiseerde soort die voornamelijk wordt gewaardeerd door alpine tuiniers vanwege zijn rotsplant-karakteristieken. Het is geen soort die op grote schaal wordt gekweekt of veredeld, waardoor het aantal benoemde variëteiten en cultivars zeer beperkt is, zo niet onbestaand in de commerciële handel. De plant wordt doorgaans in zijn natuurlijke vorm of als een wilde collectie type ('*C. sartori* type') aangeboden. Er zijn momenteel geen specifiek benoemde cultivars bekend met unieke, gedocumenteerde namen en beschrijvingen die breed verkrijgbaar zijn.

Familie

Campanula sartori behoort tot de familie *Campanulaceae*, de Klokjesfamilie.

Hoogte

Dit is een dwergsoort, typisch voor rotsplanten uit bergachtige gebieden. De plant bereikt doorgaans een hoogte van slechts 5 tot 15 centimeter.

Bloemkleur

De bloemkleur is over het algemeen bleek lila-blauw tot lichtpaars. De bloemen zijn relatief groot ten opzichte van de kleine plant.

Bladkleur

Het blad is klein, rond tot ovaal en heeft een middengroene kleur.

Bloeiperiode

De bloeiperiode valt doorgaans in de late lente tot vroege zomer, ongeveer van mei tot juli, afhankelijk van de hoogte en lokale klimaatomstandigheden.



Standplaats

Als rotsplant heeft *Campanula sartori* een voorkeur voor zeer goed doorlatende, stenige of kalkrijke grond. Het gedijt het beste in volle zon of lichte schaduw, en vereist een plek met goede luchtcirculatie om rotten tegen te gaan.

Herkomst

Campanula sartori is endemisch in Griekenland, met name in de Peloponnesos. Het groeit in spleten en op rotswanden in bergachtige gebieden.

Soort Gewas

Het is een overblijvende (vaste) plant, die een kussen- of polvormige groeiwijze ontwikkelt.

Vermeerderingswijze

Vermeerdering vindt voornamelijk plaats door zaad, dat vers of na een koude stratificatieperiode kan worden gezaaid. Het is ook mogelijk om stekken te nemen van jonge scheuten.

Klimaatzone

Gezien zijn bergachtige herkomst en zeldzaamheid in de teelt, zijn precieze USDA-zones moeilijk vast te stellen, maar de plant wordt geschat op een bereik van USDA-zones 6 tot 8. Goede drainage is cruciaal voor overleving in koude, natte winters.

Insecten

Zoals de meeste *Campanula*-soorten trekt *Campanula sartori* diverse bestuivers aan, waaronder kleine bijen en andere vliegende insecten. Vanwege zijn gespecialiseerde, rotsachtige habitat in de natuur, is hij relatief resistent tegen veel voorkomende tuininsecten, maar in cultuur kunnen slakken of mijten een probleem vormen.

Bronvermelding:

<https://powo.science.kew.org/>

<https://www.alpinegardensociety.net/>

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	<i>Campana</i> (Latijn: klokje), <i>sartori</i> (eerbetoon aan botanicus Giovanni Sartori)
Taxonomie	Rijk: <i>Plantae</i> , Afdeling: <i>Tracheophyta</i> , Klasse: <i>Magnoliopsida</i> , Orde: <i>Asterales</i> , Familie: <i>Campanulaceae</i> , Geslacht: <i>Campanula</i> , Soort: <i>Campanula sartori</i>
Synoniemen	Geen wijdverbreide of algemeen geaccepteerde botanische synoniemen
Variëteiten en Cultivars	Geen specifiek benoemde of breed verkrijgbare cultivars of variëteiten
Familie	<i>Campanulaceae</i> (Klokjesfamilie)
Hoogte	5 tot 15 centimeter
Bloemkleur	Bleek lila-blauw tot lichtpaars
Bladkleur	Middengroen
Bloeiperiode	Mei tot juli
Standplaats	Volle zon of lichte schaduw, zeer goed doorlatende, stenige of kalkrijke grond
Herkomst	Endemisch in Griekenland (Peloponnesos)
Soort Gewas	Overblijvende (vaste) plant (rotsplant)
Vermeerderingswijze	Zaad (met koude stratificatie) of stekken
Klimaatzone	USDA-zones 6 tot 8 (vereist goede drainage)
Insecten	Trekt bestuivers aan (kleine bijen); in cultuur soms last van slakken of mijten