



Campanula wanneri

Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Campanula* is afgeleid van het Latijnse woord '*campana*', wat 'klokje' betekent, en verwijst naar de klokvormige bloemen die kenmerkend zijn voor deze planten. De soortaanduiding '*wanneri*' is een eerbetoon aan de Oostenrijkse botanicus Anton Wanner (1811–1873).

Taxonomie

- Rijk: *Plantae* (Planten)
- Orde: *Asterales*
- Familie: *Campanulaceae* (Klokjesfamilie)
- Geslacht: *Campanula* (Klokje)
- Soort: *Campanula wanneri*

Synoniemen

Campanula wanneri heeft een aantal synoniemen, waaronder *Campanula carpatica* subsp. *wanneri* en *Campanula alpina* var. *wanneri*.

Eventuele variëteiten en cultivars

Er zijn geen algemeen erkende of veelvoorkomende variëteiten van *Campanula wanneri*.

Cultivars omvatten onder andere: 'Alba' (met witte bloemen) en 'Blue Gown' (met intens blauwe bloemen).

Familie

Campanula wanneri behoort tot de familie *Campanulaceae*, de klokjesfamilie.

Hoogte

De plant bereikt doorgaans een hoogte tussen 10 en 25 centimeter, afhankelijk van de groeiomstandigheden.



Foto: Peter Hellings

Bloemkleur

De bloemkleur is meestal violetblauw tot lichtpaars.

Bladkleur

De bladeren zijn middelgroen tot donkergroen.

Bloeiperiode

De bloeiperiode valt over het algemeen in de zomermaanden, van juni tot augustus.

Standplaats

Campanula wanneri gedijt het beste op een standplaats in de volle zon tot lichte schaduw. De grond moet goed doorlatend zijn, bij voorkeur kalkrijk of neutraal, en matig voedselrijk. Ze zijn geschikt voor rotstuinen of voor aan de rand van borders.

Herkomst

Deze soort is inheems in Zuidoost-Europa, met name in de Karpaten en op de Balkan, waaronder landen als Roemenië en Bulgarije.

Soort gewas

Het is een kruidachtige, over het algemeen kortlevende vaste plant (meerjarig) of soms tweejarige plant.

Vermeerderingswijze

Vermeerdering kan plaatsvinden door zaad, dat vaak gemakkelijk kiemt, of door deling van de pol in het voorjaar.

Klimaatzone


De gebruikelijke USDA-winterhardheidszones voor *Campanula wanneri* zijn zones 3 tot 7.

Insecten

Zoals veel *Campanula*-soorten kan *C. wanneri* worden bezocht door bestuivende insecten zoals bijen en vlinders. De plant kan soms gevoelig zijn voor slakkenvraat, vooral in vochtige omstandigheden.

Bronvermelding

- <https://www.rhs.org.uk/plants/3052/campanula-wanneri/details>
 - <https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=277432>
-



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	<i>Campanula</i> van Latijns 'campana' (klokje); <i>wanneri</i> eerbetoon aan botanicus Anton Wanner.
Taxonomie	Rijk: <i>Plantae</i> , Clade: Tracheofyten, Clade: Angiospermen, Clade: Eudicots, Clade: Asteriden, Orde: <i>Asterales</i> , Familie: <i>Campanulaceae</i> , Geslacht: <i>Campanula</i> , Soort: <i>Campanula wanneri</i> .
Synoniemen	<i>Campanula carpatica</i> subsp. <i>wanneri</i> , <i>Campanula alpina</i> var. <i>wanneri</i> .
Variëteiten en cultivars	Variëteiten: geen algemeen erkende; Cultivars: 'Alba', 'Blue Gown'.
Familie	<i>Campanulaceae</i> (Klokjesfamilie).
Hoogte	10 tot 25 centimeter.
Bloemkleur	Violetblauw tot lichtpaars.
Bladkleur	Middelgroen tot donkergroen.
Bloeiperiode	Juni tot augustus (zomer).
Standplaats	Volle zon tot lichte schaduw, goed doorlatende, bij voorkeur kalkrijke of neutrale, matig voedselrijke grond.
Herkomst	Zuidoost-Europa (Karpaten, Balkan, o.a. Roemenië en Bulgarije).
Soort gewas	Kruidachtige, over het algemeen kortlevende vaste plant of soms tweejarige plant.
Vermeerderingswijze	Zaad, deling van de pol (voorjaar).
Klimaatzone (usda-zones)	Zones 3 tot 7.
Insecten	Bestuivers (bijen, vlinders); soms gevoelig voor slakken.