



Centaurea achтарovii



Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Centaurea* is afgeleid van de centaur Chiron uit de Griekse mythologie, die bekend stond om zijn kennis van geneeskrachtige kruiden. De soortaanduiding *achтарovii* is een eerbetoon aan Boris Achтарov (1885-1959), een Bulgaarse botanicus die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de studie van de Bulgaarse flora.

Taxonomie

De taxonomische classificatie van *Centaurea achtarovii* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Clade: Tracheophytes (Vaatplanten)
- Clade: Angiosperms (Bedektzadigen)
- Clade: Eudicots (Tweezaadlobbigen)
- Clade: Asterids
- Orde: Asterales
- Familie: Asteraceae (Composietenfamilie)
- Geslacht: *Centaurea*
- Soort: *Centaurea achtarovii*

Synoniemen

- *Centaurea montana* subsp. *achtarovii* (Urum.) Hayek
- *Centaurea triumfettii* subsp. *achtarovii* (Urum.) Kozuharov & N.Andreev
- *Cyanus achtarovii* (Urum.) Holub

Deze synoniemen laten zien dat er in het verleden verschillende opvattingen zijn geweest over de taxonomische positie van deze soort.

Variëteiten en Cultivars

Er zijn geen bekende variëteiten of cultivars van *Centaurea achtarovii*.

Familie

Centaurea achtarovii behoort tot de Asteraceae (Composietenfamilie), een zeer grote familie met wereldwijd verspreide kruidachtige planten, struiken en bomen. Kenmerkend zijn de bloemhoofdjes (capitula) die zijn samengesteld uit vele kleine bloemetjes. Bekende voorbeelden zijn madeliefjes, zonnebloemen en paardenbloemen.

Hoogte

Centaurea achtarovii is een relatief kleine soort die meestal tussen de 2 en 12 (soms tot 20) centimeter hoog wordt.

Bloemkleur

De bloemen van *Centaurea achtarovii* zijn paars tot violet. De bloemhoofdjes zijn 3 tot 4 centimeter breed.



Bladkleur

De bladeren van *Centaurea achтарovii* zijn grijsgroen tot witachtig behaard. De bladeren in de basisrozet zijn breed elliptisch tot spatelvormig, met een gave rand of soms veerdelig.

Bloeiperiode

Centaurea achтарovii bloeit in de zomer, meestal van juni tot augustus.

Standplaats

Centaurea achтарovii groeit in het wild op rotsachtige plaatsen en graslanden in bergachtige gebieden. In de tuin prefereert deze plant een zonnige standplaats op een goed doorlatende, bij voorkeur kalkrijke bodem. Het is een geschikte plant voor rotstuinen en alpiene tuinen.

Herkomst

Centaurea achтарovii is inheems in het zuidwesten van Bulgarije, met name in het Pirin-gebergte.

Soort Gewas

Centaurea achтарovii is een overblijvende, kruidachtige plant met een korte wortelstok (rhizoom).

Vermeerderingswijze

Centaurea achтарovii kan worden vermeerderd door zaad of door wortelstekken.

Klimaatzone (USDA-zones)

Centaurea achтарovii is waarschijnlijk winterhard in USDA-zones 5 tot en met 8.

Insecten

Net als andere *Centaurea*-soorten wordt *Centaurea achтарovii* bezocht door diverse bestuivende insecten, zoals bijen, vlinders en vliegen.

Bronvermelding

- https://bgflora.net/families/asteraceae/centaurea/centaurea_achtarovii/centaurea_achtarovii_en.html
 - <http://encyclopaedia.alpinegardensociety.net/plants/Centaurea/achtarovii>
 - <https://www.gbif.org/species/3089573>
 - <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:189780-1>
-



Samenvatting

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	<i>Centaurea</i> (centaur Chiron), <i>achtarovii</i> (naar Boris Achtarov)
Taxonomie	Rijk: Plantae, Clade: Tracheophytes, Clade: Angiosperms, Clade: Eudicots, Clade: Asterids, Orde: Asterales, Familie: Asteraceae, Geslacht: <i>Centaurea</i> , Soort: <i>Centaurea achtarovii</i>
Synoniemen	<i>Centaurea montana</i> subsp. <i>achtarovii</i> , <i>Centaurea triumfettii</i> subsp. <i>achtarovii</i> , <i>Cyanus achtarovii</i>
Variëteiten/Cultivars	Geen bekende variëteiten of cultivars
Familie	Asteraceae (Composietenfamilie)
Hoogte	2-12 (soms tot 20) cm
Bloemkleur	Paars tot violet
Bladkleur	Grijsgroen tot witachtig behaard
Bloeiperiode	Zomer (juni-augustus)
Standplaats	Zonnige standplaats, goed doorlatende, bij voorkeur kalkrijke bodem
Herkomst	Zuidwest-Bulgarije (Pirin-gebergte)
Soort gewas	Overblijvende, kruidachtige plant met rhizoom
Vermeerdering	Zaad, wortelstekken
Klimaatzone	USDA-zones 5-8 (waarschijnlijk)
Insecten	Diverse bestuivende insecten (bijen, vlinders, vliegen)