



Cistus laurifolius

Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Cistus* is afgeleid van het Oudgriekse *kistos*, wat de oude naam voor deze plant was en mogelijk verband houdt met het Griekse woord voor 'doos' of 'capsule' (*kistē*), verwijzend naar de vorm van de zaaddoos. De soortaanduiding *laurifolius* is een samenstelling van de Latijnse woorden *laurus* (laurier) en *folium* (blad), wat 'met laurierblad' betekent. Dit verwijst naar de gelijkenis van de donkergroene, leerachtige bladeren van deze soort met die van de laurierboom (*Laurus nobilis*). De Nederlandse naam is Laurierbladige cistus of Rotsroos.

Taxonomie

- Rijk: *Plantae* (Planten)
- Orde: *Malvales*
- Familie: *Cistaceae* (Zonneroosjesfamilie)
- Geslacht: *Cistus*
- Soort: *C. laurifolius*



Foto: Peter Hellings

Synoniemen

De soort *Cistus laurifolius* L. kent enkele historische of minder algemeen geaccepteerde synoniemen, maar wordt doorgaans onder zijn geldige naam erkend. De volgende namen zijn onder andere in omloop geweest:

- *Cistus cyprius* Lam. (Hoewel *C. cyprius* nu vaak wordt beschouwd als de hybride *C. X cyprius* van *C. laurifolius* X *C. ladanifer*.)
- *Cistus laurifolius* var. *laurifolius* (Wordt soms gebruikt om de typesoort te onderscheiden van de variëteit *Cistus laurifolius* var. *atlantis*.)

Variëteiten en Cultivars

Cistus laurifolius is zelf een belangrijke ouder in diverse winterharde hybriden en cultivars. Hoewel de pure soort populair is, zijn er enkele variëteiten en hybriden die vaak met de soort worden geassocieerd:

- *Cistus laurifolius* var. *atlantis*: Een variëteit uit Marokko die mogelijk een meer compacte groei of een grotere bloemgrootte vertoont, maar wordt vaak als botanische variëteit en niet als cultivar behandeld.
- *Cistus X cyprius* (een hybride van *C. laurifolius* X *C. ladanifer*): Dit is een zeer populaire hybride die wordt gekenmerkt door grote witte bloemen met een opvallende, donkerrode of paarsbruine vlek aan de basis van elk kroonblad. De plant is vaak iets groter en rijkbloeiender dan *C. laurifolius*.
- *Cistus X argenteus* 'Silver Pink' (een complexe hybride waarbij *C. laurifolius* een rol speelt): Deze cultivar is beroemd om zijn zachtroze bloemen en grijsgroene bladeren, en staat bekend om zijn relatief goede winterhardheid.
- *Cistus X dansereaui* 'Decumbens' (hybride tussen *C. laurifolius* en *C. X algarensis*): Een kruipende, lage cultivar die uitstekend als bodembedekker kan worden gebruikt, met witte bloemen die een rode vlek in het centrum hebben.

Familie

De Laurierbladige cistus behoort tot de familie *Cistaceae*, de Zonneroosjesfamilie. Dit is een familie van bloeiende planten die voornamelijk struiken en halfheesters omvatten, bekend om hun korte maar overvloedige bloei en hun aanpassing aan droge, mediterrane klimaten.

Hoogte

Dit is een middelgrote, groenblijvende struik. *Cistus laurifolius* bereikt een volwassen hoogte van doorgaans 1 tot 1,5 meter en heeft een vergelijkbare spreiding. De groeiwijze is bossig en dicht vertakt.

Bloemkleur

De bloemen zijn opvallend wit, vaak crêpeachtig of papierachtig van textuur, met vijf kroonbladen. Het centrum van de bloem wordt geaccentueerd door opvallende, contrasterende goudgele meeldraden. Soms is de basis van de kroonbladeren lichtgeel getint. Hoewel de individuele bloemen slechts één dag bloeien, produceert de struik gedurende de bloeiperiode continu nieuwe bloemen.



Bladkleur

De bladeren zijn het hele jaar door groenblijvend. Ze zijn donkergroen en leerachtig aan de bovenzijde, en vaak grijsachtig tot bruin en viltig aan de onderzijde. Zoals de soort aanduiding aangeeft, lijken ze op die van de laurier. Het blad is plakkerig vanwege een harsachtige substantie, een aanpassing aan droogte.

Bloeiperiode

De bloeiperiode van *Cistus laurifolius* valt in de late lente en de zomer. De hoofdbloei strekt zich uit van juni tot en met augustus.

Standplaats

Deze rotsroos vereist een warme en zonnige standplaats. De plant is uitermate geschikt voor tuinen op het zuiden, rotstuinen en droge hellingen. De bodem moet absoluut goed gedraineerd zijn, aangezien de plant een hekel heeft aan natte voeten, vooral in de winter. Hij verdraagt matig voedselarme, rotsachtige, zandige en zelfs kleiachtige grond, en kan ook goed tegen zoute wind (kustgebieden).

Herkomst

Cistus laurifolius is inheems in het westelijke en centrale Middellandse Zeegebied, met name in Zuidwest-Europa. De plant is te vinden in Spanje, Frankrijk, Italië en Noord-Afrika, waar het groeit in het *maquis* en *garrigue* struikgewas.

Soort gewas

De plant is een groenblijvende heester of halfheester (*struik*). Het is een houtige, dicht vertakte plant die zich prima leent als solitair, accentplant of voor groepsbeplanting in droge, mediterrane tuinen.

Vermeerderingswijze

Vermeerdering van de soort kan plaatsvinden door zaaien. Cultivars en variëteiten worden meestal vegetatief vermeerderd om de gewenste eigenschappen te behouden. Dit gebeurt door halfhoutachtige stekken te nemen in de late zomer. De stekken wortelen het beste in een zanderig, goed doorlatend substraat, soms met behulp van stekpoeder.

Klimaatzone

Cistus laurifolius wordt beschouwd als een van de meest winterharde *Cistus*-soorten. De plant verdraagt temperaturen tot ongeveer –18 °C (USDA-zones 7 t/m 10).

Insecten

De bloemen van de Rotsroos zijn een belangrijke voedselbron voor bestuivers. De helderwitte bloemen met de gele centra trekken bijen en vlinders aan, waardoor de plant een uitstekende aanvulling is op een bestuivers- of vlindertuin. De plant wordt over het algemeen weinig geplaagd door ziekten of plagen.

Bronvermelding

<https://www.heijnen-planten.nl/cistus>

<https://plantlust.com/plants/10303/cistus-laurifolius/>

<https://yarinde.nl/products/cistus-laurifolius>

<https://hessenhof.nl/plants/cistus-laurifolius-cislau>



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	<i>Cistus</i> : Oudgriekse naam voor de plant, verwijst mogelijk naar de zaaddoos. <i>laurifolius</i> : Latijn voor 'met laurierblad' (verwijst naar de bladvorm).
Taxonomie	Rijk: <i>Plantae</i> , Orde: <i>Malvales</i> , Familie: <i>Cistaceae</i> , Geslacht: <i>Cistus</i> , Soort: <i>C. laurifolius</i> .
Synoniemen	<i>Cistus cyprius</i> Lam. (nu vaak hybride), <i>Cistus laurifolius</i> var. <i>laurifolius</i> .
Variëteiten en Cultivars	<i>Cistus laurifolius</i> var. <i>atlantis</i> ; Gerelateerde hybriden: <i>C. cyprius</i> (witte bloem met rode vlek), <i>C. argenteus</i> 'Silver Pink' (roze), <i>C. dansereaui</i> 'Decumbens' (laag, kruipend).
Familie	<i>Cistaceae</i> (Zonneroosjesfamilie)
Hoogte	100 tot 150 centimeter
Bloemkleur	Wit met een goudgeel centrum van meeldraden.
Bladkleur	Donkergroen en leerachtig (bovenzijde), grijsgroen en viltig (onderzijde). Wintergroen.
Bloeiperiode	Juni tot augustus
Standplaats	Volle zon, goed gedraineerde, warme grond. Verdraagt droogte en zoute wind.
Herkomst	Zuidwest-Europa en Middellandse Zeegebied (Spanje, Frankrijk, Noord-Afrika).
Soort gewas	Groenblijvende heester of halfheester (struik).
Vermeerderingswijze	Zaaien en halfhoutachtige stekken.
Klimaatzone	USDA-zone 7 tot USDA-zone 10.
Insecten	Trekt bijen en vlinders aan.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com

Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com

Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>