



Clematis cirrhosa

Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Clematis* stamt uit het Grieks en betekent 'rankende of klimmende plant', wat verwijst naar de groeiwijze van deze planten. De soortnaam *cirrhosa* is afgeleid van het Latijnse woord *cirrus*, wat 'rank' of 'krul' betekent, en beschrijft de klimstructuur van de plant, die zich vasthecht door middel van bladstelen die als ranken fungeren.

Taxonomie

De plant *Clematis cirrhosa* is taxonomisch als volgt ingedeeld:

- Rijk: *Plantae* (Planten)
- Orde: *Ranunculales* (Ranonkelachtigen)
- Familie: *Ranunculaceae* (Ranonkelfamilie)
- Geslacht: *Clematis* (Bosrank)
- Soort: *C. cirrhosa*

Synoniemen

Enkele synoniemen voor *Clematis cirrhosa* zijn *Clematis balearica* en *Clematis calicina*. De naam *Clematis balearica* wordt soms gebruikt als variëteit, maar is ook een geaccepteerd synoniem voor de soort in het algemeen.



Foto: Harrie de Vries

Variëteiten en Cultivars

Clematis cirrhosa kent enkele erkende variëteiten en diverse cultivars, die zich onderscheiden in bloemkleur,-vorm en bladvorm.

- *Clematis cirrhosa* var. *balearica*: Deze variëteit, ook bekend als de Balearenbosrank, heeft typisch meer groenachtige tot geelwitte, gespikkelde bloemen en het blad is diep ingesneden, vaak bronskleurig in de winter.
- *Clematis cirrhosa* var. *purpurascens*: Een variëteit die zich onderscheidt door de neiging tot purperkleuring van de bloemen.
- *Clematis cirrhosa* 'Freckles': Een populaire cultivar met roomwitte tot bleekgele bloemen die opvallende, dieprode tot kastanjebruine spikkels aan de binnenkant van de kelkbladeren vertonen, vandaar de naam 'Freckles' (sproeten). De bloemen zijn vaak klokvormig.
- *Clematis cirrhosa* 'Jingle Bells': Deze cultivar staat bekend om zijn crèmewitte tot ivoorkleurige, hangende, klokvormige bloemen die in de winter verschijnen. Ze zijn meestal ongespikkeld en geuren licht.
- *Clematis cirrhosa* 'Ourika': Een cultivar met helderwitte tot roomwitte, grotere bloemen die verschijnen van de winter tot het vroege voorjaar.
- *Clematis cirrhosa* 'Lansdowne Gem': Een cultivar met een dieper crèmekleurige basis van de bloem, vaak met roodbruine tinten aan de buitenkant, wat een warme uitstraling geeft.

Familie

Clematis cirrhosa behoort tot de familie Ranunculaceae, oftewel de Ranonkelfamilie.

Hoogte

De klimplant kan een hoogte bereiken van ongeveer 3 tot 5 meter, afhankelijk van de standplaats en de aanwezige steunstructuur.

Bloemkleur

De bloemkleur van de wilde soort varieert van crèmewit tot bleekgeel, vaak met een groenige of geelgroene tint. Sommige variëteiten en cultivars vertonen rode of paarsbruine spikkels aan de binnenzijde of krijgen een roze-achtige blos.

Bladkleur

De bladkleur is doorgaans middengroen en semi-wintergroen tot wintergroen, wat betekent dat de plant een groot deel of alle bladeren behoudt in de winter, vooral in mildere klimaten. In koude periodes of bij bepaalde variëteiten (var. *balearica*) kan het blad een bronskleurige tot paarse tint aannemen.

Bloeiperiode

Clematis cirrhosa is een winterbloeier, met de hoofdbloeiperiode van december tot maart, afhankelijk van de lokale klimaatzone en de specifieke cultivar.

Standplaats

De plant prefereert een standplaats in de volle zon tot lichte schaduw. Het is belangrijk dat de voet van de plant beschaduwde en koel blijft (een lichte schaduw daar is ideaal), terwijl de ranken de zon kunnen bereiken. De bodem moet goed gedraineerd en vruchtbaar zijn.



Herkomst

De plant is van nature inheems in het Middellandse Zeegebied, inclusief Zuid-Europa, Noord-Afrika en eilanden zoals de Balearen.

Soort gewas

Het is een lianen- of klimplant, die zich vasthecht met behulp van slingerende bladstelen. Het wordt vaak beschouwd als een wintergroene of semi-wintergroene heesterachtige klimplant.

Vermeerderingswijze

De meest gebruikelijke methoden voor de vermeerdering zijn stekken (in de zomer) en afleggen. Ook is zaaien mogelijk, maar dit vereist geduld en de resulterende planten kunnen variëren van de moederplant.

Klimaatzone (USDA-zones)

Clematis cirrhosa is over het algemeen winterhard in USDA-zones 7 tot 10. In zone 7 heeft de plant winterbescherming nodig of moet deze op een beschutte plek worden geplant.

Insecten

De plant wordt over het algemeen als weinig gevoelig voor ernstige plagen beschouwd. Soms kunnen bladluizen en de larven van de bosrankgalmug (*Dasineura clematidis*) optreden. Slakken kunnen jonge scheuten beschadigen. De meest bekende bedreiging voor *Clematis* in het algemeen, de zogenaamde *Clematis* verwelkingsziekte (*Clematis Wilt*), treft *C. cirrhosa* zelden of nooit.

Bronvermelding

<https://www.rhs.org.uk/plants/64360/clematis-cirrhosa/details>

<https://www.mobot.org/gardeninghelp/plantfinder/Plant.asp?code=E670>

https://en.wikipedia.org/wiki/Clematis_cirrhosa

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	<i>Clematis</i> (Grieks: rankend/klimmend), <i>cirrrosa</i> (Latijn: rank/krul, verwijst naar de klimstructuur).
Taxonomie	Rijk: <i>Plantae</i> , Familie: Ranunculaceae, Geslacht: <i>Clematis</i> , Soort: <i>C. cirrhosa</i>
Synoniemen	<i>Clematis balearica</i> , <i>Clematis calicina</i>
Variëteiten en Cultivars	<i>C. cirrhosa</i> var. <i>balearica</i> , <i>C. cirrhosa</i> var. <i>purpurascens</i> , <i>C. cirrhosa</i> 'Freckles', <i>C. cirrhosa</i> 'Jingle Bells', <i>C. cirrhosa</i> 'Ourika', <i>C. cirrhosa</i> 'Lansdowne Gem'
Familie	Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)
Hoogte	3 tot 5 meter
Bloemkleur	Crèmewit tot bleekgeel, vaak met groenige tint; sommige cultivars met rode/paarsbruine spikkels.
Bladkleur	Middengroen, semi-wintergroen tot wintergroen; kan bronskleurig/paars worden in de winter.
Bloeiperiode	December tot maart (winterbloeier)
Standplaats	Volle zon tot lichte schaduw; voet van de plant beschaduwed en koel; goed gedraineerde bodem.
Herkomst	Middellandse Zeegebied (Zuid-Europa, Noord-Afrika)
Soort gewas	Lianen- of klimplant (wintergroene/semi-wintergroene heesterachtige klimplant)
Vermeerderingswijze	Stekken, afleggen, zaaien
Klimaatzone (USDA-zones)	USDA-zones 7 tot 10
Insecten	Over het algemeen weinig gevoelig; incidenteel bladluizen, larven bosrankgalmug; slakken bij jonge scheuten.