



Corydalis 'Kingfisher' (*flexuosa* x *cashmeriana*)

Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Corydalis* is afgeleid van het Griekse woord "korydalis", wat "leeuwerik" betekent. Dit verwijst naar de vorm van de bloem, die enigszins lijkt op de kuif van een leeuwerik. De cultivarnaam 'Kingfisher' is Engels voor "ijsvogel", een vogel met vaak helderblauwe veren, wat verwijst naar de opvallende blauwe kleur van de bloemen. De toevoeging (*flexuosa* x *cashmeriana*) geeft aan dat het om een hybride gaat, een kruising tussen de soorten *Corydalis flexuosa* en *Corydalis cashmeriana*.

Taxonomie

De taxonomische classificatie van *Corydalis* 'Kingfisher' is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Orde: Ranunculales
- Familie: Papaveraceae (Papaverfamilie)
- Geslacht: *Corydalis*
- Soort: Hybride (*Corydalis flexuosa* x *cashmeriana*)
- Cultivar: 'Kingfisher'



Synoniemen

Aangezien 'Kingfisher' een cultivar is, zijn er geen botanische synoniemen. Wel wordt soms de aanduiding *Corydalis flexuosa* x *cashmeriana* 'Kingfisher' gebruikt om de afkomst te benadrukken.

Variëteiten en Cultivars

'Kingfisher' is zelf een cultivar en er zijn geen bekende verdere variëteiten of cultivars die direct van 'Kingfisher' zijn afgeleid. Wel bestaan er veel andere cultivars en soorten binnen het geslacht *Corydalis*, met diverse bloemkleuren en groeiwijzen.

Familie

Corydalis 'Kingfisher' behoort tot de Papaveraceae (Papaverfamilie). Deze familie omvat kruidachtige planten, vaak met melksap. Kenmerkend zijn de vaak opvallende bloemen met vier tot zes kroonbladeren en vele meeldraden. Bekende voorbeelden zijn klaprozen (*Papaver*) en slaapmutsjes (*Eschscholzia*).

Hoogte

Corydalis 'Kingfisher' wordt ongeveer 20 tot 30 centimeter hoog.

Bloemkleur

De bloemen van *Corydalis* 'Kingfisher' zijn helder, intens turquoise-blauw met donkerpaarse punten op de binnenste bloemblaadjes. Dit is een belangrijk kenmerk en de reden voor de naam 'Kingfisher'.

Bladkleur

De bladeren van *Corydalis* 'Kingfisher' zijn blauwgroen, soms met een paarse tint, en fijn verdeeld.

Bloeiperiode

Corydalis 'Kingfisher' bloeit in het voorjaar en de vroege zomer. Onder gunstige omstandigheden (voldoende vocht) kan de bloei doorlopen tot in de herfst.

Standplaats

Corydalis 'Kingfisher' prefereert een standplaats in de halfschaduw op een humusrijke, goed doorlatende maar vochtige bodem. Het is belangrijk dat de grond niet uitdroogt, vooral niet tijdens de bloeiperiode.



Herkomst

Corydalis 'Kingfisher' is een hybride die is ontwikkeld door Keith Lever in Wales. De oudersoorten, *Corydalis flexuosa* en *Corydalis cashmeriana*, komen respectievelijk uit Oost-Azië en de Himalaya.

Soort Gewas

Corydalis 'Kingfisher' is een overblijvende, kruidachtige plant met wortelstokken.

Vermeerderingswijze

Corydalis 'Kingfisher' kan worden vermeerderd door deling van de wortelstokken in de herfst. Zaadvermeerdering is ook mogelijk, maar de nakomelingen kunnen afwijken van de ouderplant.

Klimaatzone (USDA-zones)

Corydalis 'Kingfisher' is winterhard in USDA-zones 5 tot en met 8.

Insecten

Corydalis soorten worden over het algemeen bezocht door diverse bestuivende insecten, zoals bijen en hommels.

Bronvermelding

- <https://www.rhs.org.uk/plants/182179/corydalis-kingfisher/details>
 - <https://dorsetperennials.co.uk/product/corydalis-kingfisher/>
 - <https://www.hessenhof.nl/arch/c511.html>
-

Samenvatting

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	<i>Corydalis</i> (leeuwerik), 'Kingfisher' (ijsvogel), (<i>flexuosa</i> x <i>cashmeriana</i>)
Taxonomie	Rijk: Plantae, Clade: Tracheophytes, Clade: Angiosperms, Clade: Eudicots, Orde: Ranunculales, Familie: Papaveraceae, Geslacht: <i>Corydalis</i> , Soort: Hybride (<i>Corydalis flexuosa</i> x <i>cashmeriana</i>), Cultivar: 'Kingfisher'
Synoniemen	<i>Corydalis flexuosa</i> x <i>cashmeriana</i> 'Kingfisher'
Variëteiten/Cultivars	Geen bekende afgeleide variëteiten of cultivars
Familie	Papaveraceae (Papaverfamilie)
Hoogte	20-30 cm
Bloemkleur	Helder turquoise-blauw met donkerpaarse punten
Bladkleur	Blauwgroen, soms met paarse tint, fijn verdeeld
Bloeiperiode	Voorjaar, vroege zomer, mogelijk doorlopend tot herfst
Standplaats	Halfschaduw, humusrijke, goed doorlatende maar vochtige bodem
Herkomst	Ontwikkeld door Keith Lever (Wales), oudersoorten uit Oost-Azië en de Himalaya
Soort gewas	Overblijvende, kruidachtige plant met wortelstokken
Vermeerdering	Deling van wortelstokken (herfst), zaad
Klimaatzone	USDA-zones 5-8
Insecten	Diverse bestuivende insecten (bijen, hommels)