



Corydalis schanginii

Nomenclatuur en Etymologie

De wetenschappelijke naam *Corydalis schanginii* is afgeleid van het Griekse woord *korydalos* (leeuwerik) vanwege de karakteristieke sporen van de bloem. De soortaanduiding *schanginii* eert een persoon, vermoedelijk een botanist of verzamelaar, maar details over de herkomst van deze naam zijn schaars.

Taxonomie

- Rijk: Plantae (Planten)
- Klasse: Magnoliopsida (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Ranunculales
- Familie: Papaveraceae (Papaverfamilie)
- Geslacht: *Corydalis*
- Soort: *Corydalis schanginii*

Synoniemen

Enkele synoniemen van *Corydalis schanginii* zijn:

- *Corydalis schanginii* subsp. *alataavica*
- *Corydalis schanginii* var. *sary-cheleki*

Variëteiten en Cultivars

Deze soort kent verschillende ondersoorten en variëteiten, waaronder:

- *Corydalis schanginii* subsp. *alataavica*: Een ondersoort met subtiele variaties in bloemkleur en habitat.
- *Corydalis schanginii* var. *sary-cheleki*: Kenmerkend door zijn smalle verspreidingsgebied in Kirgizië.



Foto: Gert Hoek

Familie

Corydalis schanginii behoort tot de Papaveraceae, een familie van planten die vaak bekend staan om hun kleurrijke bloemen en sierlijke bladstructuren.

Hoogte

De plant bereikt een bescheiden hoogte van ongeveer 10-20 cm, waardoor het een ideale keuze is voor rotstuinen en compacte perken.

Bloemkleur

De bloemen variëren van lichtroze tot intens karmozijnrood, afhankelijk van de ondersoort of variëteit.

Bladkleur

Het blad is blauwgroen tot zilverachtig van kleur en heeft een fijn verdeelde structuur, wat bijdraagt aan de sierwaarde van de plant.

Bloeiperiode

Corydalis schanginii bloeit vroeg in het seizoen, meestal in april en mei, afhankelijk van de klimaatomstandigheden.

Standplaats

De plant prefereert zonnige tot licht beschaduwde locaties met een goed doorlatende, kalkrijke en stenige bodem.

Herkomst

De soort komt van nature voor in bergachtige gebieden van Centraal-Azië, waaronder Kirgizië en Kazachstan. Hier groeit het op rotsachtige hellingen en in steppeachtige habitats.

Soort Gewas

Corydalis schanginii is een overblijvende kruidachtige plant die vooral geliefd is in rotstuinen vanwege zijn compacte formaat en kleurrijke bloemen.

Vermeerderingswijze

De plant kan worden vermeerderd door:

- Zaaien, bij voorkeur direct na het rijpen van de zaden.
- Scheuren van volwassen planten, hoewel dit minder gangbaar is vanwege de delicate wortelstructuur.

Klimaatzone

De plant is winterhard in USDA-zones 4 tot 7, wat betekent dat het bestand is tegen koude winters, mits de grond goed gedraineerd is.



Insecten

De bloemen worden bezocht door bestuivers zoals bijen en vlinders, die aangetrokken worden door de nectar en kleur.

Bronvermelding

- <https://www.alpinegardensociety.net/plant/corydalis-schanginii/>
 - <https://www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/CorydalisSpecies>
 - https://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=120&taxon_id=250084131
-

Samenvatting

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur	Naam verwijst naar leeuwerik en eert een persoon (schanginii).
Taxonomie	Plantae, Magnoliopsida, Ranunculales, Papaveraceae, <i>Corydalis schanginii</i> .
Synoniemen	<i>C. schanginii subsp. alatafica</i> , <i>C. schanginii var. sary-cheleki</i> .
Variëteiten en Cultivars	<i>Subsp. alatafica</i> , <i>Var. sary-cheleki</i> .
Familie	Papaveraceae.
Hoogte	10-20 cm.
Bloemkleur	Lichtroze tot karmozijnrood.
Bladkleur	Blauwgroen tot zilverachtig.
Bloeiperiode	April-mei.
Standplaats	Zonnig tot licht beschaduwde; stenige, kalkrijke bodem.
Herkomst	Centraal-Azië, berggebieden van Kirgizië en Kazachstan.
Soort gewas	Overblijvend kruid.
Vermeerderingswijze	Zaaien, scheuren.
Klimaatzone	USDA-zones 4-7.
Insecten	Bijen en vlinders.