



Cyclamen confusum

Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Cyclamen* is afgeleid van het Griekse woord *kyklos*, wat 'cirkel' of 'schijf' betekent, verwijzend naar de ronde, afgeplatte knol van de plant. De soortnaam *confusum* is afgeleid van het Latijnse *confusus*, wat 'verward' of 'onzeker' betekent. Deze naam werd gegeven omdat de soort lange tijd werd verward met of geclassificeerd als een variëteit van de nauw verwante *Cyclamen hederifolium* voordat het als een aparte soort werd erkend op basis van morfologische en genetische verschillen.

Taxonomie

De plant *Cyclamen confusum* is taxonomisch als volgt ingedeeld:

- Rijk: *Plantae* (Planten)
- Clade: Tracheophyta (Vaatplanten)
- Clade: Angiospermae (Bedektzadigen)
- Clade: Eudicotyledonae (Eudicotylen)
- Orde: Ericales
- Familie: Primulaceae (Sleutelbloemfamilie)
- Geslacht: *Cyclamen*
- Soort: *C. confusum*

Synoniemen

Een zeer belangrijk synoniem voor *Cyclamen confusum* is *Cyclamen hederifolium* subsp. *confusum*. Voordat de soort in 1993 als een aparte soort werd beschreven door Grey-Wilson, werd het beschouwd als een ondersoort van de *Cyclamen hederifolium*, en in de praktijk wordt de plant soms nog steeds onder die naam verkocht.



Variëteiten en Cultivars

Cyclamen confusum is een relatief nieuwe en botanische soort die vooral door gespecialiseerde verzamelaars wordt gekweekt. Het is een wilde soort, en er zijn dan ook zeer weinig officieel benoemde cultivars. De variatie binnen de soort zit voornamelijk in de bladeren.

- *Cyclamen confusum* (met zilveren bladeren): Hoewel geen formele cultivar, worden individuele planten geselecteerd op basis van hun opvallende bladeren, die een breed, zilverkleurig patroon vertonen dat bekend staat als 'hertshoofd'-patroon.
- *Cyclamen confusum* (met donkere bloemen): Planten met een diepere roze tot magenta bloemkleur worden soms informeel geselecteerd voor de kweek.
- *Cyclamen confusum* (met 'pewter' bladeren): Selecties met bladeren die een egaal, tin- of leigrijs patroon hebben over het gehele bladoppervlak.

Familie

Cyclamen confusum behoort tot de familie Primulaceae, oftewel de Sleutelbloemfamilie. Historisch werd *Cyclamen* soms geplaatst in de familie Myrsinaceae of een aparte familie Cyclaminaceae, maar de huidige classificatie plaatst het onder Primulaceae.

Hoogte

Dit is een kleine, knolvormende plant die slechts een hoogte bereikt van 10 tot 15 centimeter wanneer deze in bloei staat. Het is een bodembedekker.

Bloemkleur

De bloemkleur varieert van lichtroze tot magenta of dieproze. Kenmerkend voor de soort is de aanwezigheid van een donkere V-vormige vlek aan de basis van elk kroonblad, die soms lichter is dan bij de nauw verwante *C. hederifolium*.

Bladkleur

De bladkleur is doorgaans middengroen met een opvallend zilverkleurig of crèmekleurig marmerpatroon op de bovenzijde. De onderzijde van het blad is vaak roodachtig of paarsachtig. De bladeren verschijnen vóór of gelijktijdig met de bloemen.

Bloeiperiode

De bloeiperiode valt in de herfst, meestal van september tot november, wat het een waardevolle plant maakt voor de nazomer en vroege wintertuin.

Standplaats

De plant gedijt het beste in de halfschaduw tot schaduw, ideaal onder loofbomen of heesters. De bodem moet goed gedraineerd zijn, humusrijk en bij voorkeur kalkhoudend. De knollen moeten oppervlakkig worden geplant.



Herkomst

Cyclamen confusum is endemisch op de Griekse eilanden Kreta en Rodos en enkele kleinere Egeïsche eilanden. Het groeit in rotsachtige gebieden en in de schaduw van bossen.

Soort gewas

Het is een knolgewas en een kruidachtige vaste plant die 's zomers in rust gaat (zomer-slapend of zomer-dormant) en in de herfst weer opkomt.

Vermeerderingswijze

De meest natuurlijke en gebruikelijke methode is zaaien. De zaden hebben mieren nodig om te worden verspreid (*myrmecochorie*) en kiemen het beste na een periode van warmte en vocht. Grotere, oudere knollen kunnen ook zeer voorzichtig worden gedeeld, maar dit is riskant.

Klimaatzone (USDA-zones)

Cyclamen confusum is geschikt voor USDA-zones 7 tot 9, mits de bodem goed gedraineerd is en de zomer niet te heet.

Insecten

De plant is over het algemeen vrij van ernstige ziekten. De knol kan worden aangetast door de cyclamenmijt (*Phytonemus pallidus*), maar in de buitenteelt is dit zeldzaam. Slakken kunnen een probleem vormen, met name voor de bloemen en jonge bladeren.

Bronvermelding

http://www.cyclamen.org/confusum_set.html

<https://www.rhs.org.uk/plants/45532/cyclamen-confusum/details>

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclamen_confusum

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	<i>Cyclamen</i> (Grieks: cirkel/schijf, knolvorm), <i>confusum</i> (Latijn: verward/onzeker, was verward met andere soorten).
Taxonomie	Rijk: <i>Plantae</i> , Familie: Primulaceae, Geslacht: <i>Cyclamen</i> , Soort: <i>C. confusum</i>
Synoniemen	<i>Cyclamen hederifolium</i> subsp. <i>confusum</i>
Variëteiten en Cultivars	<i>C. confusum</i> (met zilveren bladeren), <i>C. confusum</i> (met donkere bloemen), <i>C. confusum</i> (met 'pewter' bladeren)
Familie	Primulaceae (Sleutelbloemfamilie)
Hoogte	10 tot 15 centimeter
Bloemkleur	Lichtroze tot magenta of dieproze, met een donkere V-vlek aan de basis.
Bladkleur	Middengroen met zilverkleurig of crèmekleurig marmerpatroon; onderzijde vaak roodachtig.
Bloeiperiode	September tot november (herfst)
Standplaats	Halfschaduw tot schaduw; goed gedraineerd, humusrijk en kalkhoudend.
Herkomst	Endemisch op Kreta, Rhodos en andere Egeïsche eilanden (Griekenland).
Soort gewas	Knolgewas en kruidachtige vaste plant (zomer-slapend).
Vermeerderingswijze	Zaaien (mierenverspreiding, stratificatie), zeer voorzichtig delen van knollen.
Klimaatzone (USDA-zones)	USDA-zones 7 tot 9
Insecten	Zelden cyclamenmijt; slakken kunnen bloemen en jonge bladeren beschadigen.