



Daphne retusa



Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Daphne* is afkomstig uit de Griekse mythologie, waar *Daphne* de naam was van een nimf die, om aan de god Apollo te ontsnappen, door haar vader in een laurierboom werd veranderd. De naam *Daphne* betekent laurier in het Grieks. De soortaanduiding *retusa* komt uit het Latijn en betekent stompvormig met een uitgerande top, wat een directe verwijzing is naar de uiterlijke kenmerken van de bladeren van deze plant. De Nederlandse naam voor het geslacht is Peperboompje. De soort werd beschreven door William Hemsley in 1892.

Taxonomie

Daphne retusa is een soort binnen het plantenrijk (*Plantae*). De classificatie is als volgt:

- Rijk: *Plantae* (Planten)
- Orde: *Malvales*
- Familie: *Thymelaeaceae*
- Geslacht: *Daphne*
- Soort: *Daphne retusa*

Synoniemen

Een veelgebruikt synoniem voor *Daphne retusa* is *Daphne tangutica*. Botanische autoriteiten beschouwen *Daphne retusa* tegenwoordig vaak als onderdeel van *Daphne tangutica* of als een groep binnen die soort (*Daphne tangutica* Retusa Group).

Variëteiten en Cultivars

Er zijn geen specifieke botanische variëteiten of cultivars geregistreerd die direct van *Daphne retusa* afstammen. Het is een botanische soort die vooral in liefhebberskringen en rotstuinen wordt gekweekt. Eventuele variaties zijn meestal natuurlijke selecties of zaailingen binnen de soort zelf. Een gerelateerde hybride is *Daphne x mantensiana*, een kruising tussen *Daphne x burkwoodii* en *Daphne retusa*.

Familie

Daphne retusa behoort tot de familie van de *Thymelaeaceae* (Peperboompjesfamilie).

Hoogte

Dit is een lage, dichte heester. De volwassen hoogte ligt meestal tussen de 0,5 en 1,25 meter. De breedte is vergelijkbaar met de hoogte, wat resulteert in een compacte, afgeronde groeiwijze.

Bloemkleur

De bloemen zijn zeer geurend en verschijnen in dichte, eindstandige clusters. De buitenkant van de bloembuis is roze tot paarsrood, terwijl de binnenkant vaak bleker is, variërend van wit tot lichtroze, soms met een paarse tint. De bloemen hebben een sterke, aangename geur, die doet denken aan seringen (*syrinus*).

Bladkleur

De bladeren zijn glanzend donkergroen, dik en leerachtig. Ze zijn ovaal tot omgekeerd eivormig en dicht op de takken gerangschikt, vooral aan de uiteinden. De plant is groenblijvend, wat betekent dat het blad de hele winter aan de struik blijft.

Bloeiperiode

De hoofdbloeiperiode valt in de lente, meestal van april tot en met mei of begin juni. De bloei wordt soms gevolgd door een lichte tweede bloei in de nazomer.



Standplaats

Daphne retusa verlangt een plek in de zon of halfschaduw, bij voorkeur beschermd tegen de hete middagzon, vooral in warmere klimaten. De plant vereist een vochthoudende tot vochtige, humusrijke grond met een neutrale tot basische zuurgraad (pH 7-9). Essentieel is een zeer goed doorlatende bodem om wortelrot te voorkomen.

Herkomst

Deze soort is inheems in het oosten van de Himalaya en West-China, inclusief gebieden in Szechuan en het oosten van Tibet (Xizang). De plant groeit van nature op hoge elevaties, tot 4100 meter.

Soort Gewas

Het is een groenblijvende heester met een langzame groei en een dichte, ronde vorm. Het is een zeer gewaardeerde sierstruik voor de voorrand van borders, rotstuinen en beschutte stadstuinen. Alle delen van de plant zijn giftig.

Vermeerderingswijze

Vermeerdering vindt plaats via zaad, halfverhoude of zachte stekken of enten. De soort laat zich lastig verplanten zodra deze goed is gevestigd. Daarom wordt de plant vaak geënt op een onderstam, zoals *Daphne mezereum*, om de kweekbaarheid te vergemakkelijken. Vermeerdering uit zaad is ook mogelijk.

Klimaatzone (USDA-zones)

Daphne retusa is een zeer winterharde soort, vaak geclassificeerd in USDA Hardiness Zones 5 tot 8. Dit betekent dat de plant goed bestand is tegen aanzienlijke kou.

Insecten

De geurige bloemen trekken bijen en andere bestuivers aan. De bessen trekken vogels aan, maar zijn giftig voor mensen en huisdieren. De plant kan soms gevoelig zijn voor bladluizen en virussen.

Bronvermelding


<https://tuinseizoen.com/daphne-retusa/>

<https://volkoomen.nl/planten/daphne>

<https://www.rhs.org.uk/plants/101168/daphne-tangutica-retusa-group/details>

<https://www.wilsonbrosgardens.com/daphne-retusa-tangut-2g.html>

<https://plants.ces.ncsu.edu/plants/daphne-tangutica/>



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	<i>Daphne</i> van Grieks 'laurier' (mythologie); <i>retusa</i> van Latijn 'stomp met uitgerande top' (bladkenmerk).
Taxonomie	Rijk: <i>Plantae</i> , Orde: <i>Malvales</i> , Familie: <i>Thymelaeaceae</i> , Geslacht: <i>Daphne</i> , Soort: <i>Daphne retusa</i>
Synoniemen	<i>Daphne tangutica</i> (veelgebruikt, wordt vaak als groep behandeld: <i>Daphne tangutica</i> Retusa Group)
Variëteiten en Cultivars	Geen specifieke cultivars direct van <i>Daphne retusa</i> ; wel gebruikt in hybriden zoals <i>Daphne x mantensiana</i> .
Familie	<i>Thymelaeaceae</i> (Peperboompjesfamilie)
Hoogte	0,5 tot 1,25 meter
Bloemkleur	Purperroze buitenkant, wit tot lichtroze binnenkant, sterk geurend.
Bladkleur	Glanzend donkergroen, dik en leerachtig, groenblijvend.
Bloeiperiode	Lente (april-mei/juni), soms een tweede bloei in de nazomer.
Standplaats	Zon of halfschaduw (beschut tegen middagzon), vochthoudende, humusrijke, goed doorlatende grond.
Herkomst	West-China en Oost-Himalaya (o.a. Tibet en Szechuan).
Soort Gewas	Groenblijvende heester, langzame groei, compacte en dichte vorm, zeer giftig.
Vermeerderingswijze	Zaad, zachte of halfverhoude stekken, enten (vaak op <i>Daphne mezereum</i>).
Klimaatzone (USDA-zones)	USDA-zones 5 tot 8.
Insecten	Trekt bijen aan; bessen trekken vogels aan; gevoelig voor bladluizen.