



Dipcadi serotinum

Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Dipcadi* is afgeleid van een Turkse naam voor de muskus hyacint (een andere bolplant). De soortaanduiding *serotinum* komt uit het Latijn en betekent 'laat' of 'laat in het jaar', wat suggereert dat de plant laat bloeit. Hoewel sommige bronnen de betekenis 'laatbloeiend' interpreteren als bloeiend in de herfst, komt de feitelijke bloeiperiode van *D. serotinum* in zijn natuurlijke habitat en in cultuur meestal in het voorjaar of de vroege zomer.

Taxonomie

Dipcadi serotinum is een bolgewas dat behoort tot het rijk *Plantae* (Planten), stam *Magnoliophyta* (Vaatplanten), klasse *Liliopsida* (Eenzaadlobbigen), orde *Asparagales* (Aspergeachtigen), en is ingedeeld in de familie *Asparagaceae* (Aspergefamilie), onderfamilie *Scilloideae*. Vroeger werd dit geslacht vaak ondergebracht in de familie *Liliaceae* of *Hyacinthaceae*.



Foto: Harrie de Vries

Synoniemen

Een bekend synoniem voor *Dipcadi serotinum* is *Hyacinthus serotinus*.

Variëteiten en Cultivars

Er is één bekende variëteit:

Dipcadi serotinum var. *fulvum* (Cav.) Ball: Deze variëteit is inheems op de Canarische Eilanden en het westelijke Middellandse Zeegebied. Over cultivars van *D. serotinum* zijn in de gangbare literatuur geen specifieke namen met een korte beschrijving te vinden; de plant wordt voornamelijk als botanische soort of in zijn natuurlijke variëteit aangeboden en gekweekt door liefhebbers van bolgewassen.

Familie

Dipcadi serotinum behoort tot de familie *Asparagaceae* (Aspergefamilie), en meer specifiek tot de onderfamilie *Scilloideae*.

Hoogte

De plant bereikt een statuurhoogte tussen de 10 en 40 centimeter.

Bloemkleur

De bloemen van *Dipcadi serotinum* zijn onopvallend van kleur en worden vaak omschreven als groengeel, crème, bruin of oranje-bruin. De binnenste drie bloemblaadjes vormen een halfopen klokje, terwijl de buitenste smaller en langer zijn en volledig uitgespreid staan. Vanwege de bruinachtige, onopvallende kleur wordt hij soms de 'bruine boshyacint' genoemd.

Bladkleur

De bladeren zijn over het algemeen groen.

Bloeiperiode

De bloeiperiode van *Dipcadi serotinum* valt doorgaans in het voorjaar tot de vroege zomer. In zijn natuurlijke habitat en in cultuur in West-Europa ligt dit vaak tussen maart/april en mei-juli. De onbebladerde bloemstengels komen omhoog om een losse bloemtros te vormen.

Standplaats

De plant gedijt het beste op een zonnige, warme en droge plek. De grond moet goed doorlatend zijn om bolrot te voorkomen, bij voorkeur stenige, rotsachtige of zanderige grond die 's winters goed draineert.

Herkomst

Dipcadi serotinum is inheems in het westelijke Middellandse Zeegebied, waaronder het Iberisch Schiereiland (Spanje en Portugal), Zuid-Frankrijk, Italië, de Balearen, Noordwest-Afrika (Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Westelijke Sahara) en de Canarische Eilanden.



Soort gewas

Het is een meerjarige, kruidachtige bolplant (*geofyt*), wat betekent dat het overlevingsorgaan (de bol) onder de grond ligt.

Vermeerderingswijze

De plant kan worden vermeerderd door middel van zaad, dat hij in grote hoeveelheden produceert, of door de broedbolletjes die hij vormt.

Klimaatzone (usda-zones)

Dipcadi serotinum wordt vaak geassocieerd met een Mediterraan klimaat (droge zomers, milde, natte winters). Het heeft een USDA winterhardheidszone van 7, wat betekent dat het enige bescherming tegen extreme kou nodig heeft en niet bestand is tegen strenge vorst.

Insecten

Dipcadi serotinum wordt beschouwd als een bijen- en vlinderplant, wat aangeeft dat de bloemen bestoven worden door deze insecten.

Bronvermelding

- <https://www.allesoverbloembollen.nl/bloembollen-soorten/zomerbloeiende-bolgewassen/dipcadi/>
- <https://earthone.io/nl/plant/dipcadi%20serotinum>
- <https://www.first-nature.com/flowers/dipcadi-serotinum.php>
- <https://bihrmann.com/caudiciforms/subs/dip-ser-sub.asp>
- <https://www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/Dipcadi>
- <https://nl.wikipedia.org/wiki/Dipcadi>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Dipcadi>
- https://www.picturethisai.com/nl/wiki/Dipcadi_serotinum.html
- <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77189053-1>
- https://www.picturethisai.com/nl/care/Dipcadi_serotinum.html
- <https://hessenhof.nl/plants/dipcadi-serotinum-dipser>

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	<i>Dipcadi</i> is afgeleid van een Turkse naam voor de muskus hyacint; <i>serotinum</i> (Latijn) betekent 'laat' of 'laat in het jaar'.
Taxonomie	Rijk: <i>Plantae</i> ; Stam: <i>Magnoliophyta</i> ; Klasse: <i>Liliopsida</i> ; Orde: <i>Asparagales</i> ; Familie: <i>Asparagaceae</i> ; Onderfamilie: <i>Scilloideae</i> ; Geslacht: <i>Dipcadi</i> ; Soort: <i>Dipcadi serotinum</i>
Synoniemen	<i>Hyacinthus serotinus</i>
Variëteiten en Cultivars	Variëteit: <i>Dipcadi serotinum</i> var. <i>fulvum</i> (Cav.) Ball (Canarische Eilanden, W. Medit.). Geen specifieke cultivars met beschrijving bekend.
Familie	<i>Asparagaceae</i> (Aspergefamilie)
Hoogte	10 tot 40 centimeter
Bloemkleur	Groengeel, crème, bruin, oranje-bruin
Bladkleur	Groen
Bloeiperiode	Maart/april tot mei-juli (voorjaar tot vroege zomer)
Standplaats	Volle zon, droge, goed doorlatende, stenige of zanderige grond
Herkomst	Westelijk Middellandse Zeegebied, Iberisch Schiereiland, Zuid-Frankrijk, Italië, Balearen, Noordwest-Afrika, Canarische Eilanden
Soort gewas	Meerjarige, kruidachtige bolplant (geofyt)
Vermeerderingswijze	Zaad, broedbolletjes
Klimaatzone (usda-zones)	USDA Zone 7
Insecten	Bijenplant, vlinderplant