



Draba ramosissima

Nomenclatuur/etymologie

De geslachtsnaam *Draba* komt van het Griekse woord 'drabe' of 'drabein', wat 'scherp' of 'bitter' betekent, vermoedelijk verwijzend naar de smaak van de bladeren, wat kenmerkend is voor de kruisbloemenfamilie. De soortnaam *ramosissima* is afgeleid van het Latijn en is een vergrotende trap van 'ramosus', wat 'vertakt' betekent. *Ramosissima* betekent dus 'zeer sterk vertakt', wat verwijst naar de groeiwijze en de panikelvormige vertakte bloeiwijze van de stengels van deze plant. De soort werd voor het eerst beschreven door Desvaux in 1815.

Taxonomie

- Rijk: *Plantae*
- Orde: Brassicales
- Familie: *Brassicaceae*
- Geslacht: *Draba*
- Soort: *Draba ramosissima*

Synoniemen

Volgens de *Plants of the World Online* (Kew Science) wordt de naam *Draba ramosissima* geaccepteerd. Historische en heterotypische synoniemen omvatten onder meer *Alyssum dentatum* Nutt., *Draba arabisans* Pursh (nom. illeg.), *Draba dentata* Hook. & Arn., *Draba incana* var. *ramosissima* (Desv.) Kurtz en *Draba ramosissima* var. *glabrifolia* E.L.Braun.

Variëteiten en cultivars

Er zijn weinig tot geen cultivars van *Draba ramosissima* specifiek bekend in de commerciële handel. De plant wordt meestal als botanische soort in rotstuinen gebruikt. De variëteit *Draba ramosissima* var. *glabrifolia* wordt nu beschouwd als een synoniem van de hoofdsort. De soort wordt in het Engels wel aangeduid met de algemene namen 'Branched Draba' of 'Branched Whitlow-grass'.

Familie

Draba ramosissima behoort tot de familie *Brassicaceae*, de kruisbloemenfamilie.

Hoogte

Dit is een relatief kleine plant. De dichte, overblijvende bladrozetten blijven laag bij de grond (ongeveer 5 cm hoog). De bloeistengels, die panikelvormig vertakt zijn, worden over het algemeen 7 tot 38 cm hoog, met een maximale hoogte van ongeveer 50 cm.

Bloemkleur

De bloemen van *Draba ramosissima* zijn wit.

Bladkleur

De bladeren zijn groen en staan in rozetten aan de basis van de plant. Ze zijn behaard met meervoudig vertakte haren en hebben vaak getande of gezaagde randen. Het is een bladhoudende, wintergroene plant.

Bloeiperiode

De bloeiperiode ligt in het voorjaar tot de vroege zomer, doorgaans van april tot juni.

Standplaats

De plant gedijt het beste op een standplaats in de volle zon tot lichte halfschaduw. Cruciaal is de bodemgesteldheid: deze moet droog en zeer goed doorlatend zijn, vaak rotsachtig of stenig, en bij voorkeur kalkminnend (neutraal tot alkalisch). Het is een typische rotsplant die in de natuur voorkomt op kalksteenklippen en rotsachtige bosgebieden.

Herkomst

Draba ramosissima is inheems in het oosten en midden van de Verenigde Staten, met een beperkt verspreidingsgebied in de Appalachen, de Kentucky River Palisades en Midden-Tennessee. Het komt voor in de staten West Virginia, Kentucky, Maryland, North Carolina, Tennessee en Virginia.

Soort gewas

Het is een vaste plant (*perennial herb*), die groeit als een overblijvend kruid met een vertakte caudex, een structuur die kenmerkend is voor rotsplanten.

Vermeerderingswijze

Vermeerdering vindt plaats door zaaien of door deling van de pol. Zaden kunnen in het voorjaar of de herfst worden gezaaid. Deling van de dichte pollen kan in het voorjaar worden gedaan, waarbij elke sectie met wortels opnieuw wordt geplant in goed doorlatende grond.

Klimaatzone

De plant wordt beschouwd als goed winterhard en wordt vaak ingedeeld in USDA winterhardheidszones 4 tot 8.



Insecten

Zoals veel kleine, vroegbloeiende soorten in de *Brassicaceae*, wordt *Draba ramosissima* bestoven door diverse vliegende insecten. De bloemen trekken, ondanks hun bescheiden formaat, vroege bestuivers zoals bijen.

Bronvermelding

<https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:282992-1>

https://floranorthamerica.org/Draba_amosissima

<https://www.tuinadvies.nl/plantengids/12489/draba-amosissima>

https://en.wikipedia.org/wiki/Draba_amosissima

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	<i>Draba</i> (Grieks: 'drabe', scherpe smaak), <i>ramosissima</i> (Latijn: 'zeer sterk vertakt'), Soortauteur Desvoux (1815)
Taxonomie	Rijk <i>Plantae</i> , Familie <i>Brassicaceae</i> , Geslacht <i>Draba</i> , Soort <i>Draba ramosissima</i>
Synoniemen	<i>Alyssum dentatum</i> Nutt., <i>Draba arabisans</i> Pursh, <i>Draba dentata</i> Hook. & Arn., <i>Draba incana</i> var. <i>ramosissima</i> (Desv.) Kurtz, <i>Draba ramosissima</i> var. <i>glabrifolia</i> E.L.Braun
Variëteiten en cultivars	Geen cultivars commercieel bekend. De voormalige variëteit <i>D. ramosissima</i> var. <i>glabrifolia</i> is nu een synoniem.
Familie	<i>Brassicaceae</i> (Kruisbloemenfamilie)
Hoogte	7 tot 38 cm (bloeistengels)
Bloemkleur	Wit
Bladkleur	Groen (grijsgroen door beharing)
Bloeiperiode	April tot juni
Standplaats	Volle zon/halfschaduw, droge, zeer goed doorlatende, kalkrijke, rotsachtige of stenige bodem
Herkomst	Oosten en Midden-Verenigde Staten (Appalachen)
Soort gewas	Vaste plant/Rotsplant
Vermeerderingswijze	Zaaien, deling van de pol
Klimaatzone	USDA zones 4 tot 8
Insecten	Bestuiving door diverse vliegende insecten, zoals bijen