



Hepatica transsylvanica



Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Hepatica* is afgeleid van het Griekse woord "hepar", wat "lever" betekent. Dit verwijst naar de vorm van de bladeren, die enigszins op een lever lijken. De soortaanduiding *transsylvanica* verwijst naar Transsylvanië, een historische regio in Roemenië, waar deze soort inheems is.

Taxonomie

De taxonomische classificatie van *Hepatica transsylvanica* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Orde: Ranunculales
- Familie: Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)
- Geslacht: *Hepatica*
- Soort: *Hepatica transsylvanica*

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com
Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com
Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl
Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Synoniemen

- *Anemone transsilvanica* (Fuss) Heuff.

Net als *Hepatica nobilis* is ook deze soort in het verleden tot het geslacht *Anemone* gerekend.

Variëteiten en Cultivars

Er zijn geen officieel erkende variëteiten van *Hepatica transsilvanica*. Er zijn wel enkele cultivars geselecteerd, waaronder:

- 'Buis': Een veel voorkomende cultivar met lichtblauwe bloemen.
- 'Eisvogel': Een cultivar met helderblauwe bloemen.
- 'Loddon Blue': Een cultivar met donkerblauwe bloemen.

Familie

Hepatica transsilvanica behoort tot de Ranunculaceae (Ranonkelfamilie). Deze familie omvat kruidachtige planten, vaak met giftige stoffen. De bloemen hebben meestal vijf kelkbladen (die vaak op kroonbladen lijken) en een variabel aantal kroonbladen (die soms afwezig zijn of omgevormd tot honingklieren). Bekende voorbeelden zijn boterbloemen (*Ranunculus*), ridderspoor (*Delphinium*) en anemoon (*Anemone*).

Hoogte

Hepatica transsilvanica wordt meestal 10 tot 20 centimeter hoog.

Bloemkleur

De bloemen van *Hepatica transsilvanica* zijn meestal lichtblauw tot blauwpaars.

Bladkleur

De bladeren van *Hepatica transsilvanica* zijn donkergroen, drielobbig en hebben gekartelde randen. Soms zijn de bladeren vijflobbig als de buitenste lobben nog eens zijn gedeeld. Ze blijven de winter groen.

Bloeiperiode

Hepatica transsilvanica bloeit vroeg in het voorjaar, meestal van maart tot april.

Standplaats

Hepatica transsilvanica prefereert een halfbeschaduwde tot schaduwrijke standplaats op een goed doorlatende, humusrijke en kalkrijke bodem. Het is belangrijk dat de grond niet te droog is, vooral niet in de zomer.



Herkomst

Hepatica transsylvanica is inheems in de Karpaten in Roemenië, met name in Transsylvanië.

Soort Gewas

Hepatica transsylvanica is een overblijvende, kruidachtige plant.

Vermeerderingswijze

Hepatica transsylvanica kan worden vermeerderd door zaad of door deling. Zaad kan in het najaar worden gezaaid. Deling kan in het voorjaar of na de bloei worden gedaan.

Klimaatzone (USDA-zones)

Hepatica transsylvanica is winterhard in USDA-zones 4 tot en met 8.

Insecten

Hepatica transsylvanica wordt bestoven door insecten, met name door bijen en vliegen.

Verschillen met *Hepatica nobilis*

- *H. transsylvanica* heeft meestal grotere bloemen dan *H. nobilis*.
- De bladeren van *H. transsylvanica* hebben gekartelde randen, terwijl de bladeren van *H. nobilis* gaafrandige lobben hebben.
- *H. transsylvanica* heeft over het algemeen een wat lossere groeiwijze dan *H. nobilis*.

Bijzonderheden

- *Hepatica transsylvanica* is een vroege voorjaarsbloeier die kleur brengt in de tuin na de winter.
- De plant is relatief onderhoudsarm.
- De bladeren blijven de winter groen en zijn ook decoratief.

Bronvermelding

- https://nl.wikipedia.org/wiki/Hepatica_transsilvanica
 - https://en.wikipedia.org/wiki/Hepatica_transsilvanica
 - <https://www.groenrijk.nl/plantengids/plant/vaste-plant/hepatica-transsylvanica-buis>
 - <https://www.hessenhof.nl/al/h078.html>
-



Samenvatting

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	<i>Hepatica</i> (lever), <i>transsylvanica</i> (uit Transsylvanië)
Taxonomie	Rijk: Plantae, Clade: Tracheophytes, Clade: Angiosperms, Clade: Eudicots, Orde: Ranunculales, Familie: Ranunculaceae, Geslacht: <i>Hepatica</i> , Soort: <i>Hepatica transsylvanica</i>
Synoniemen	<i>Anemone transsilvanica</i> (Fuss) Heuff.
Variëteiten/Cultivars	Cultivars zoals 'Buis', 'Eisvogel' en 'Loddon Blue'
Familie	Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)
Hoogte	10-20 cm
Bloemkleur	Meestal lichtblauw tot blauwpaars
Bladkleur	Donkergroen, drielobbig (soms vijflobbig), gekartelde randen, wintergroen
Bloeiperiode	Maart-april
Standplaats	Halfschaduw tot schaduw, goed doorlatende, humusrijke en kalkrijke bodem
Herkomst	Karpaten in Roemenië (Transsylvanië)
Soort gewas	Overblijvende, kruidachtige plant
Vermeerdering	Zaad, deling
Klimaatzone	USDA-zones 4-8
Insecten	Bijen, vliegen
Verschillen met <i>H. nobilis</i>	Grotere bloemen, gekartelde bladranden, lossere groeiwijze
Bijzonderheden	Vroege voorjaarsbloeier, onderhoudsarm, decoratief blad