



# Nothoscordum hirtellum

## Nomenclatuur/etymologie

De geslachtsnaam *Nothoscordum* is afgeleid van de Griekse woorden *nothos* (vals of onecht) en *skordon* (look of knoflook), wat verwijst naar de uiterlijke gelijkenis met look (*Allium*), maar het ontbreken van de kenmerkende knoflookgeur. De soortnaam *hirtellum* is afgeleid van het Latijnse woord *hirtus*, wat ruw of harig betekent, en het verkleinwoord suffix *-ellus*, wat wijst op de lichte beharing van delen van de plant, zoals de bladeren en stengels.

## Taxonomie

- Rijk: *Plantae*
- Orde: *Asparagales*
- Familie: *Amaryllidaceae*
- Onderfamilie: *Allioideae*
- Stam: *Allieae*
- Geslacht: *Nothoscordum*
- Soort: *Nothoscordum hirtellum*



Foto NRV: NN

## Synoniemen

Enkele synoniemen voor *Nothoscordum hirtellum* zijn *Nothoscordum aureum*, *Nothoscordum dialystemon*, *Nothoscordum inodorum* var. *aureum*, *Nothoscordum sellowianum*, *Nothoscordum striatum* var. *aureum*, *Nothoscordum pulchellum* en *Ipheion hirtellum*.

## Variëteiten en cultivars

Er zijn weinig benoemde variëteiten of cultivars specifiek van *Nothoscordum hirtellum* die in de handel of literatuur algemeen bekend zijn, wat vaker het geval is bij wilde soorten die voornamelijk als botanische verzamelobjecten of wilde bloemen worden beschouwd. De soort wordt meestal onder de wetenschappelijke naam verkocht zonder verdere onderverdeling in cultivars.

## Familie

*Nothoscordum hirtellum* behoort tot de familie *Amaryllidaceae* (Narcisfamilie), een familie van eenzaadlobbige planten die bekend staat om hun bolvormende, overblijvende kruiden. Binnen deze familie wordt het ingedeeld in de onderfamilie *Allioideae*, waartoe ook het geslacht *Allium* (Look) behoort.

## Hoogte

De hoogte van *Nothoscordum hirtellum* varieert meestal tussen de 10 en 30 centimeter, afhankelijk van de groeiomstandigheden, waarbij de bloemstengels de bladeren overstijgen.

## Bloemkleur

De bloemkleur van *Nothoscordum hirtellum* is typisch heldergeel tot goudgeel. De zes bloemdekbladen zijn vaak aan de buitenkant voorzien van een groenachtige of bruinachtige streep.

## Bladkleur

De bladeren van *Nothoscordum hirtellum* zijn meestal groen tot lichtgroen. Ze zijn draadvormig of lijnvormig en vaak licht behaard, wat bijdraagt aan de soortnaam *hirtellum*.

## Bloeiperiode

De bloeiperiode van *Nothoscordum hirtellum* ligt doorgaans in het voorjaar en de vroege zomer, vaak van april tot juni, maar kan in sommige mildere klimaten of in de herkomstgebieden langer duren.

## Standplaats

*Nothoscordum hirtellum* gedijt het beste op een zonnige tot licht beschaduwde standplaats. De plant geeft de voorkeur aan goed doorlatende, lichte tot zandige grond en kan enige droogte verdragen zodra deze goed gevestigd is.

## Herkomst

*Nothoscordum hirtellum* is inheems in Zuid-Amerika, met name in delen van Brazilië, Uruguay, Paraguay en Argentinië. In sommige andere delen van de wereld wordt het ook als verwilderd beschouwd.

## Soort gewas

*Nothoscordum hirtellum* is een bolgewas en een overblijvende, kruidachtige plant. Het wordt vaak gebruikt als sierplant, rotsplant of als deel van een wilde bloemenweide.



## Vermeerderingswijze

De meest voorkomende en effectieve vermeerderingswijze voor *Nothoscordum hirtellum* is door middel van de bollen. De plant vormt klonters en produceert kleine nevenbollen (klisters) die gescheiden kunnen worden en opnieuw geplant. Daarnaast kan vermeerdering ook plaatsvinden door zaad.

## Klimaatzone

*Nothoscordum hirtellum* is geschikt voor verschillende klimaatzones, maar wordt vaak aangetroffen in USDA-winterhardheidszones 8 tot 10, waar het als winterhard kan worden beschouwd. In koudere klimaten kan bescherming of oppotten nodig zijn.

## Insecten

Als een bloeiend bolgewas trekt *Nothoscordum hirtellum* bestuivende insecten aan, zoals bijen en vlinders. De plant is over het algemeen niet bijzonder gevoelig voor ernstige insectenplagen, hoewel bollenplanten soms last kunnen hebben van bolrot of tripsen.

---

## Bronvermelding

<https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:539266-1>

<https://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000570535>

<https://pza.sanbi.org/nothoscordum-inodorum>

---

## Samenvatting

| Onderwerp                | Resultaat                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomenclatuur/etymologie  | Afgeleid van Grieks <i>nothos</i> (vals), <i>skordon</i> (look) en Latijn <i>hirtellum</i> (licht behaard).                                                                                                                          |
| Taxonomie                | <i>Rijk: Plantae, Clade: Tracheophyta, Clade: Angiospermae, Clade: Monocotyledones, Orde: Asparagales, Familie: Amaryllidaceae, Onderfamilie: Allioideae, Tribus: Allieae, Geslacht: Nothoscordum, Soort: Nothoscordum hirtellum</i> |
| Synoniemen               | <i>Nothoscordum aureum, Nothoscordum dialystemon, Nothoscordum inodorum</i> var. <i>aureum, Nothoscordum sellowianum, Nothoscordum striatum</i> var. <i>aureum, Nothoscordum pulchellum, Ipheion hirtellum</i>                       |
| Variëteiten en cultivars | Weinig tot geen benoemde, algemeen bekende cultivars of variëteiten; meestal verkocht als de botanische soort.                                                                                                                       |
| Familie                  | <i>Amaryllidaceae</i> (Narcisfamilie)                                                                                                                                                                                                |
| Hoogte                   | 10 tot 30 centimeter                                                                                                                                                                                                                 |
| Bloemkleur               | Heldergeel tot goudgeel, vaak met groenachtige of bruinachtige strepen aan de buitenkant.                                                                                                                                            |
| Bladkleur                | Groen tot lichtgroen                                                                                                                                                                                                                 |
| Bloeiperiode             | Voorjaar tot vroege zomer (meestal april tot juni)                                                                                                                                                                                   |
| Standplaats              | Zonnig tot licht beschaduwde, goed doorlatende, lichte tot zandige grond.                                                                                                                                                            |
| Herkomst                 | Zuid-Amerika (Brazilië, Uruguay, Paraguay, Argentinië)                                                                                                                                                                               |
| Soort gewas              | Bolgewas, overblijvende, kruidachtige plant.                                                                                                                                                                                         |
| Vermeerderingswijze      | Door nevenbollen (klisters) en door zaad.                                                                                                                                                                                            |
| Klimaatzone              | USDA-winterhardheidszones 8 tot 10 (met bescherming in koudere zones)                                                                                                                                                                |
| Insecten                 | Trekt bestuivers aan zoals bijen en vlinders; over het algemeen niet erg gevoelig voor ernstige plagen.                                                                                                                              |