



Oenothera longifolia

Nomenclatuur/etymologie

De geslachtsnaam *Oenothera* is afgeleid van de Griekse woorden *oinos* (wijn) en *thera* (vangen of achtervolgen), wat een verwijzing kan zijn naar het feit dat een soort uit dit geslacht (*Oenothera biennis*) in de oudheid werd gebruikt om wijn te parfumeren. Een andere interpretatie stelt dat het afkomstig is van *onos* (ezel) en *thera*, omdat de wortels werden gebruikt om ezels te temmen. De soortnaam *longifolia* is afgeleid van het Latijnse *longus* (lang) en *folium* (blad), wat direct verwijst naar de relatief lange bladeren van de plant.

Taxonomie

- Rijk: *Plantae*
- Orde: *Myrtales*
- Familie: *Onagraceae*
- Geslacht: *Oenothera*
- Soort: *Oenothera longifolia*

Synoniemen

Een algemeen geaccepteerd synoniem voor *Oenothera longifolia* is *Oenothera longiflora*, wat soms in oudere literatuur wordt gebruikt.



Foto NRV: NN

Variëteiten en cultivars

Oenothera longifolia is een soort die, in vergelijking met andere *Oenothera*-soorten, beperkt is in het aantal commercieel verkrijgbare cultivars. De bekendste cultivar is *Oenothera longifolia* 'Lemon Sunset' (foto): Deze cultivar staat bekend om zijn citroengele bloemen die bij het verwelken een koraalachtige, zonsondergangachtige rode kleur aannemen. Er is ook *Oenothera* 'Summer Sun', die soms geassocieerd wordt met dit type.

Familie

Oenothera longifolia behoort tot de familie *Onagraceae* (Teunisbloemfamilie). Deze familie staat bekend om zijn vierdelige bloemen en omvat geslachten als *Fuchsia* en *Epilobium*.

Hoogte

De plant bereikt doorgaans een hoogte van 90 tot 120 centimeter (3 tot 4 voet), wat haar een van de hogere soorten binnen het geslacht *Oenothera* maakt.

Bloemkleur

De bloemen zijn helder citroengeel tot goudgeel. De knoppen en de buitenkant van de kelkbladen kunnen een rode of groenachtige tint hebben. De bloemen van de cultivar 'Lemon Sunset' verkleuren naar koraalrood bij het verwelken.

Bladkleur

De bladeren zijn over het algemeen groen tot grijsgroen. Ze zijn lang, smal (lancetvormig) en zittend, wat consistent is met de soortnaam *longifolia*.

Bloeiperiode

De bloeiperiode van *Oenothera longifolia* is typisch lang en valt in de zomer, meestal van juni tot augustus. De bloemen openen vaak 's avonds en blijven de volgende ochtend nog open, een kenmerk van veel teunisbloemen.

Standplaats

Deze plant gedijt het beste op een standplaats in de volle zon. De ideale grond is goed doorlatend, zelfs matig droog, en mag arm tot matig voedselrijk zijn. Het verdraagt geen natte, zware grond, vooral niet in de winter.

Herkomst

Oenothera longifolia is van nature wijdverbreid in Zuid-Amerika, met een oorspronkelijk verspreidingsgebied in Argentinië, Uruguay en Brazilië.

Soort gewas

Het is een tweejarige plant of een kortlevende vaste plant die zich gemakkelijk uitzaait, waardoor het in de tuin als een vaste plant kan functioneren. Het is een kruidachtige plant die na de bloei afsterft, maar zorgt voor nageslacht.



Vermeerderingswijze

De meest gebruikelijke en eenvoudige vermeerderingswijze is door zaad. De plant zaait zich in de tuin vaak spontaan uit. Daarnaast kan de plant in het voorjaar of de late zomer worden vermeerderd door wortelstekken te nemen.

Klimaatzone

Oenothera longifolia is over het algemeen winterhard in USDA-zones 5 tot 9. Het kan lichte tot matige vorst verdragen, mits de grond goed gedraineerd is.

Insecten

Net als veel andere teunisbloemen worden de bloemen van *Oenothera longifolia* 's avonds bestoven door nachtvlinders (motten) met lange tongen. Overdag trekken de bloemen ook bijen en andere bestuivende insecten aan. De plant wordt over het algemeen als plaagvrij beschouwd.

Bronvermelding

<http://www.plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:613437-1>

<https://www.shootgardening.com/plants/oenothera-longifolia-lemon-sunset>

<https://www.forestfarm.com/oenothera-longifolia-lemon-sunset-oelo027.html>

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	Afgeleid van Grieks <i>oinos</i> (wijn) en <i>thera</i> (vangen) of <i>onos</i> (ezel) en <i>thera</i> , en Latijn <i>longus</i> (lang) en <i>folium</i> (blad).
Taxonomie	<i>Rijk: Plantae, Clade: Tracheophyta, Clade: Angiospermae, Clade: Eudicotyledones, Clade: Rosiden, Orde: Myrtales, Familie: Onagraceae, Geslacht: Oenothera, Soort: Oenothera longifolia</i>
Synoniemen	<i>Oenothera longiflora</i>
Variëteiten en cultivars	<i>Oenothera longifolia</i> 'Lemon Sunset', <i>Oenothera</i> 'Summer Sun' (gerelateerd)
Familie	<i>Onagraceae</i> (Teunisbloemfamilie)
Hoogte	90 tot 120 centimeter
Bloemkleur	Citroengeel tot goudgeel (verkleurt naar koraalrood bij 'Lemon Sunset')
Bladkleur	Groen tot grijsgroen
Bloeiperiode	Zomer (juni tot augustus)
Standplaats	Volle zon, goed doorlatende, matig droge, arme tot matig voedselrijke grond.
Herkomst	Zuid-Amerika (Argentinië, Uruguay, Brazilië)
Soort gewas	Tweejarige of kortlevende vaste, kruidachtige plant.
Vermeerderingswijze	Door zaad (zelfzaai) en door wortelstekken.
Klimaatzone	USDA-zones 5 tot 9
Insecten	Bestoven door nachtvlinders; trekt overdag ook bijen en andere bestuivers aan.