



Onosma echioides

Nomenclatuur/etymologie

De geslachtsnaam *Onosma* is afgeleid van het Griekse woord *onos* (ezel) en *osmé* (geur), wat suggereert dat de plant in de oudheid werd gebruikt als voedsel of dat ezels er dol op waren. De soortnaam *echioides* is een samenstelling van de geslachtsnaam *Echium* (Slangenkruid) en het Griekse achtervoegsel *-oides* (lijkend op), wat duidt op de gelijkenis van de plant met soorten uit het geslacht *Echium*, vooral wat betreft de ruwe, borstelige beharing. De Nederlandse naam is vaak 'Gouden druppel'.

Taxonomie

- Rijk: *Plantae*
- Orde: *Boraginales*
- Familie: *Boraginaceae*
- Onderfamilie: *Boraginoideae*
- Geslacht: *Onosma*
- Soort: *Onosma echioides*

Synoniemen

De soort kent verschillende synoniemen en is in het verleden verward met andere soorten. Belangrijke synoniemen zijn *Cerinth echioides* (het basioniem, de naam gegeven door Linnaeus), *Onosma javorkae*, *Onosma pallida*, *Onosma pyrenaica*, *Onosma angustifolia*, en *Onosma canescens*.



Foto: Harrie de Vries

Variëteiten en cultivars

Binnen de botanische taxonomie van *Onosma echioides* worden diverse ondersoorten en variëteiten onderscheiden, die voornamelijk gebaseerd zijn op geografische verspreiding en subtiele morfologische verschillen. Voorbeelden van geaccepteerde infraspecifieke taxa zijn:

- *Onosma echioides* var. *angustifolia*
- *Onosma echioides* var. *canescens*
- *Onosma echioides* var. *dalmatica*

In de tuinbouw is de soort als geheel bekend onder de Nederlandse naam 'Gouden druppel'. Een specifieke cultivar is niet wijdverbreid in de handel, en de botanische variëteiten worden zelden als zodanig verkocht.

Familie

Onosma echioides behoort tot de familie *Boraginaceae* (Ruwbladigenfamilie). Kenmerkend voor deze familie is vaak de ruwe, behaarde bladeren en de bloemen die in schichten of aan één zijde van de stengel groeien.

Hoogte

De plant is een laagblijvende, polvormende vaste plant die een hoogte bereikt van ongeveer 15 tot 40 centimeter, afhankelijk van de variëteit en de groeiomstandigheden.

Bloemkleur

De bloemkleur is heldergeel tot goudgeel. De bloemen zijn buis- tot klokvormig en hangen in trossen aan het uiteinde van de stengels.

Bladkleur

De bladeren zijn grijsgroen of blauwgroen van kleur. Ze zijn ruw behaard met borstelige, stijve haren, wat de plant een zilvergrijze, viltige uitstraling geeft. De plant is over het algemeen wintergroen of bladhoudend.

Bloeiperiode

De bloeiperiode van *Onosma echioides* valt meestal in de late lente en vroege zomer, doorgaans van mei tot juli.

Standplaats

De ideale standplaats voor *Onosma echioides* is in de volle zon. De plant is uitermate geschikt voor rotstuinen of stenige bodems, omdat het goed doorlatende, droge tot normale grond vereist. Het verdraagt geen wintervocht of natte zomers.

Herkomst

Onosma echioides is inheems in Zuid-Europa, met name in het Middellandse Zeegebied, Sicilië en het Balkanschiereiland (zoals Albanië, voormalig Joegoslavië en Turkije-in-Europa).



Soort gewas

Het is een overblijvende, kruidachtige plant of halfheester (*subshrub*). Het is een waardevolle rotsplant vanwege zijn compacte groei en tolerantie voor droogte.

Vermeerderingswijze

De vermeerdering van *Onosma echioides* kan door zaad. Het zaad wordt meestal vroeg in het voorjaar in een kas gezaaid. Daarnaast kan de plant in de zomer worden vermeerderd door het nemen van stekken. Door de penwortelstructuur is deling moeilijk en wordt deze methode afgeraden.

Klimaatzone

De plant is redelijk winterhard, geschikt voor USDA-winterhardheidszones 7 tot 9, en kan temperaturen tot ongeveer -15°C verdragen, mits de grond in de winter droog blijft.

Insecten

De buisvormige, gele bloemen trekken bestuivende insecten aan, met name bijen en vlinders. De plant is, vanwege zijn behaarde bladeren en droge standplaatsvoorkeur, over het algemeen niet vatbaar voor ernstige insectenplagen.

Bronvermelding

<https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:119634-1>

<https://temperate.theferns.info/plant/Onosma+echioides>

<https://www.tuinadvies.be/plantengids/23007/onosma-echioides>

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	Afgeleid van Grieks <i>onos</i> (ezel) en <i>osmé</i> (geur), lijkend op <i>Echium</i> (Slangenkruid).
Taxonomie	<i>Rijk: Plantae, Clade: Tracheophyta, Clade: Angiospermae, Clade: Eudicotyledones, Clade: Asteriden, Orde: Boraginales, Familie: Boraginaceae, Onderfamilie: Boraginoideae, Geslacht: Onosma, Soort: Onosma echioides</i>
Synoniemen	<i>Cerinthe echioides, Onosma javorkae, Onosma pallida, Onosma pyrenaica, Onosma angustifolia, Onosma canescens</i>
Variëteiten en cultivars	<i>O. echioides</i> var. <i>angustifolia</i> , <i>O. echioides</i> var. <i>canescens</i> , <i>O. echioides</i> var. <i>dalmatica</i> . Geen specifieke cultivars algemeen bekend.
Familie	<i>Boraginaceae</i> (Ruwbladigenfamilie)
Hoogte	15 tot 40 centimeter
Bloemkleur	Heldergeel tot goudgeel
Bladkleur	Grijsgroen/blauwgroen, ruw behaard (zilverachtig viltig)
Bloeiperiode	Late lente en vroege zomer (mei tot juli)
Standplaats	Volle zon, goed doorlatende, droge tot normale, stenige bodem.
Herkomst	Zuid-Europa (Middellandse Zeegebied, Sicilië, Balkan)
Soort gewas	Overblijvende, kruidachtige plant/halfheester (rotsplant).
Vermeerderingswijze	Door zaad (vroeg in voorjaar zaaien) en door stekken (zomer).
Klimaatzone	USDA-zones 7 tot 9 (vereist winterdroogte)
Insecten	Trekt bestuivers aan zoals bijen en vlinders.