Saponaria ocymoides

Nomenclatuur/Etymologie

Saponaria ocymoides, algemeen bekend als Rotsanjer of Zeepkruid, behoort tot het geslacht Saponaria binnen de familie Caryophyllaceae. De naam "Saponaria" is afgeleid van het Latijnse "sapo," wat "zeep" betekent, verwijzend naar het gebruik van de plant als een natuurlijke zeepbron. "Ocymoides" betekent "lijkend op basilicum," wat verwijst naar de gelijkenis van de bladeren met die van basilicum (Ocimum).

Taxonomie

- Rijk: Plantae
- Clade: Angiosperms
- Clade: Eudicots
- Orde: Caryophyllales
- Familie: Caryophyllaceae
- Geslacht: Saponaria
- Soort: Saponaria ocymoides

Synoniemen

Voor Saponaria ocymoides zijn geen algemeen geaccepteerde synoniemen bekend. De plant wordt voornamelijk onder deze wetenschappelijke naam erkend en gekweekt.

Eventuele Variëteiten

Er zijn geen erkende variëteiten of cultivars van Saponaria ocymoides. De plant wordt meestal in zijn natuurlijke vorm gekweekt zonder onderverdelingen in cultivars of variëteiten.

Foto: Harrie de Vries

Voorzitter: voorzitter@nrvwebsite.nl
Secretariaat: secretariaat@nrvwebsite.nl
Webmaster: webmaster@nrvwebsite.nl
Website: nrvwebsite.nl
Facebook: https://www.facebook.com/groups/505404964892414
Instagram: https://www.instagram.com/rotsplantenvereniging_nrv

Familie

Saponaria ocymoides behoort tot de Caryophyllaceae familie, ook wel bekend als de anjerfamilie. Deze familie omvat veel bekende sierplanten, zoals anjers (Dianthus) en koekoeksbloemen (Lychnis).

Hoogte

Saponaria ocymoides bereikt een hoogte van 10 tot 20 cm, waardoor het een uitstekende bodembedekker is. Hij kan zich over een breedte van 30 tot 60 cm verspreiden, wat zorgt voor een dichte, laagblijvende mat.

Bloemkleur

De bloemen van Saponaria ocymoides zijn helder roze tot rood en verschijnen in dichte trossen. De bloemen zijn klein maar talrijk, wat zorgt voor een opvallende en kleurrijke vertoning.

Bladkleur

De bladeren van Saponaria ocymoides zijn groen, ovaalvormig en licht behaard. Ze vormen een aantrekkelijk contrast met de felgekleurde bloemen.

Bloeiperiode

Saponaria ocymoides bloeit van mei tot juli. De bloemen blijven enkele weken in bloei, wat zorgt voor een langdurige visuele aantrekkingskracht in de tuin.

Standplaats

Deze plant gedijt het best in volle zon tot halfschaduw en geeft de voorkeur aan goed doorlatende, kalkrijke grond. Hij is ideaal voor rotstuinen, muurbeplanting, en als bodembedekker in zonnige borders.

Herkomst

Saponaria ocymoides is inheems in Zuid- en Midden-Europa. Hij groeit daar in rotsachtige gebieden en op zonnige hellingen.

Soort Gewas

Saponaria ocymoides is een vaste plant die jaar na jaar terugkomt zonder herplanting. Hij is winterhard en kan goed omgaan met droge omstandigheden.

Vermeerderingswijze

De vermeerdering van Saponaria ocymoides gebeurt meestal via zaad of door deling. Zaden kunnen in het vroege voorjaar worden gezaaid, terwijl deling in het voorjaar of najaar kan plaatsvinden.

Klimaatzone

Saponaria ocymoides is geschikt voor USDA klimaatzones 3 tot 9. Hij is zeer winterhard en kan koude winters en warme zomers verdragen, wat hem veelzijdig maakt voor verschillende klimaten.

Insecten

Deze plant trekt bestuivende insecten aan, waaronder bijen en vlinders. De nectar- en stuifmeelrijke bloemen bieden een waardevolle bron van voedsel voor deze insecten, wat bijdraagt aan de biodiversiteit in de tuin.

Bronvermelding

- Royal Horticultural Society
- Missouri Botanical Garden
- Gardenia

Voorzitter: voorzitter@nrvwebsite.nl
Secretariaat: secretariaat@nrvwebsite.nl
Webmaster: webmaster@nrvwebsite.nl
Website: nrvwebsite.nl
Facebook: https://www.facebook.com/groups/505404964892414
Instagram: https://www.instagram.com/rotsplantenvereniging_nrv

Samenvatting

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	Saponaria ocymoides, afgeleid van 'sapo' (zeep) en 'ocymoides' (lijkend op basilicum)
Synoniemen	Geen algemeen geaccepteerde synoniemen
Variëteiten	Geen erkende variëteiten
Familie	Caryophyllaceae
Hoogte	10 tot 20 cm
Bloemkleur	Helder roze tot rood
Bladkleur	Groen, ovaalvormig, licht behaard
Bloeiperiode	Mei tot juli
Standplaats	Volle zon tot halfschaduw, goed doorlatende, kalkrijke grond
Herkomst	Inheems in Zuid- en Midden-Europa
Soort gewas	Vaste plant
Vermeerderingswijze	Zaden of deling
Klimaatzone	USDA zones 3 tot 9
Insecten	Trekt bijen, vlinders, en andere bestuivers aan