



Scilla hyacinthoides

Nomenclatuur/etymologie

De geslachtsnaam *Scilla* stamt af van het Oudgriekse 'skilla', wat de naam was voor de zee-ajuin (*Drimia maritima*, voorheen *Scilla maritima*). De soortaanduiding *hyacinthoides* is afgeleid van de naam van het geslacht *Hyacinthus* (hyacint) met het Griekse achtervoegsel '-oides', wat 'gelijkend op' of 'lijkt op' betekent, verwijzend naar de gelijkenis van de bloeiwijze met die van een hyacint. De plant werd voor het eerst wetenschappelijk beschreven door Carl Linnaeus in 1753.

Taxonomie

- Rijk: *Plantae*
- Orde: Asparagales
- Familie: Asparagaceae (Aspergefamilie)
- Onderfamilie: Scilloideae
- Geslacht: *Scilla*
- Soort: *Scilla hyacinthoides*



Foto: Harrie de Vries

Synoniemen

Een aantal namen wordt beschouwd als synoniem voor *Scilla hyacinthoides*. Enkele daarvan zijn *Barnardia hyacinthoides*, *Ornithogalum hyacinthoides*, *Urginea hyacinthoides*, *Scilla serotina*, *Scilla lingulata*, *Ledebouria hyacinthoides* en *Lachenalia hyacinthoides*.

Variëteiten en cultivars

Er zijn geen algemeen erkende variëteiten van *Scilla hyacinthoides* benoemd in de wetenschappelijke literatuur. Er zijn ook weinig specifiek genoemde cultivars van *Scilla hyacinthoides* te vinden in de handel. De plant wordt meestal als de soort zelf aangeboden.

Familie

Scilla hyacinthoides behoort tot de familie Asparagaceae (Aspergefamilie), en meer specifiek tot de onderfamilie Scilloideae (voorheen vaak behandeld als de familie Hyacinthaceae).

Hoogte

De plant bereikt doorgaans een hoogte van 30 tot 60 centimeter, afhankelijk van de groeiomstandigheden. De bloemstengel is rechtopstaand en draagt de bloeiwijze.

Bloemkleur

De bloemen van *Scilla hyacinthoides* zijn meestal lichtblauw tot blauwviolet, soms met een witte of lila tint. De individuele bloemen zijn klein en stervormig en staan in een losse, langwerpige tros.

Bladkleur

De bladeren zijn donkergroen, lancet- tot riemvormig en verschijnen meestal vroeg in het voorjaar. Ze liggen vaak enigszins vlak op de grond of zijn licht opgericht.

Bloeiperiode

De bloeiperiode van *Scilla hyacinthoides* ligt gewoonlijk in het late voorjaar tot het vroege zomer, doorgaans van mei tot juni. De bloeiwijze kan relatief lang aanhouden.

Standplaats

Scilla hyacinthoides geeft de voorkeur aan een zonnige tot halfschaduwrijke standplaats. De plant gedijt goed in goed doorlatende, humusrijke grond die niet te nat is, vooral in de winter.

Herkomst

De soort is inheems in het oostelijke Middellandse Zeegebied, het Midden-Oosten en delen van West-Azië. Het natuurlijke verspreidingsgebied strekt zich uit over landen zoals Turkije, Cyprus, Syrië, Libanon, Jordanië, Israël en Egypte.

Soort gewas

Het is een overblijvende, bolvormende plant (bolgewas) die behoort tot de geofyten. Ze sterft bovengronds af na de bloei en het rijpen van het zaad om het ongunstige seizoen ondergronds als bol te overleven.

Vermeerderingswijze

De vermeerdering van *Scilla hyacinthoides* gebeurt hoofdzakelijk door zaad en door het vormen van nevenbollen (dochterbollen) aan de basis van de moederbol. Zaaïen kan direct na de oogst of in het voorjaar na stratificatie. De bollen kunnen in de nazomer of vroege herfst geplant worden.

Klimaatzone

Scilla hyacinthoides is geschikt voor USDA winterhardheidszones 6 tot 9, wat betekent dat de plant redelijk tot goed winterhard is, mits de grond goed gedraineerd is.



Insecten

De bloemen van *Scilla hyacinthoides* trekken diverse insecten aan, met name bijen en andere bestuivers, vanwege de nectar en het stuifmeel. De plant speelt een rol in de vroege voedselvoorziening voor deze insecten.

Bronvermelding

<https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:540939-1>

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	Genoemd naar het geslacht <i>Hyacinthus</i> vanwege de gelijkenis van de bloeiwijze ('hyacinthoides' betekent 'lijkt op hyacint'); <i>Scilla</i> van Grieks 'skilla' (zee-ajuin).
Taxonomie	Rijk: <i>Plantae</i> , Clade: Tracheofyten, Clade: Bedektzadigen, Clade: Eenzaadlobbigen, Orde: Asparagales, Familie: Asparagaceae, Onderfamilie: Scilloideae, Geslacht: <i>Scilla</i> , Soort: <i>Scilla hyacinthoides</i> .
Synoniemen	<i>Barnardia hyacinthoides</i> , <i>Ornithogalum hyacinthoides</i> , <i>Urginea hyacinthoides</i> , <i>Scilla serotina</i> , <i>Scilla lingulata</i> , <i>Ledebouria hyacinthoides</i> , <i>Lachenalia hyacinthoides</i> .
Variëteiten en cultivars	Geen algemeen erkende variëteiten of specifiek genoemde cultivars in de handel.
Familie	Asparagaceae (Aspergefamilie).
Hoogte	30 tot 60 centimeter.
Bloemkleur	Lichtblauw tot blauwviolet, soms met een witte of lila tint.
Bladkleur	Donkergroen.
Bloeiperiode	Laat voorjaar tot vroege zomer (mei tot juni).
Standplaats	Zonnig tot halfschaduwrijk, goed doorlatende, humusrijke grond.
Herkomst	Oostelijke Middellandse Zeegebied, Midden-Oosten en delen van West-Azië (o.a. Turkije, Israël).
Soort gewas	Overblijvend, bolvormend gewas (geofyt).
Vermeerderingswijze	Door zaad en nevenbollen (dochterbollen).
Klimaatzone	USDA winterhardheidszones 6 tot