



Sisyrinchium macrocarpum

Nomenclatuur/etymologie

De botanische naam *Sisyrinchium macrocarpum* werd voor het eerst gepubliceerd door Georg Hans Emmo Wolfgang Hieronymus in 1881. De geslachtsnaam *Sisyrinchium* is afgeleid van het Griekse woord *sisyrinchion*, dat door Plinius en Theophrastus werd gebruikt voor een andere plant (waarschijnlijk *Iris* of *Moraea sisyrinchium*), en zou verwijzen naar de harige cormrokken die lijken op een ruige geitenharen jas (*sisýra*). De soortsaanduiding *macrocarpum* is een samenstelling van de Griekse woorden *makros* (groot) en *karpós* (vrucht), wat letterlijk "met grote vrucht" betekent en verwijst naar de relatief grote zaaddozen van deze soort. In het Nederlands wordt de plant soms aangeduid als Argentijns blauwogengras, hoewel 'blauwogengras' de algemene naam is voor het gehele geslacht, terwijl deze soort gele bloemen heeft.



Foto: Harrie de Vries

Taxonomie

De taxonomische indeling van *Sisyrinchium macrocarpum* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Orde: Asparagales
- Familie: Iridaceae (Lissenfamilie)
- Geslacht: *Sisyrinchium* L.
- Soort: *Sisyrinchium macrocarpum* Hieron.

Synoniemen

Voor *Sisyrinchium macrocarpum* Hieron. zijn, voor zover bekend in de gangbare botanische databases zoals Kew, geen geaccepteerde taxonomische synoniemen. De naam gepubliceerd door Hieronymus in 1881 is de geaccepteerde naam.

Variëteiten en cultivars

Over het algemeen staat de soort *Sisyrinchium macrocarpum* in de handel bekend om zijn kenmerkende eigenschappen en wordt deze vaak als de botanische soort verkocht. Specifiek benoemde cultivars (*cultivated varieties*) of formeel erkende variëteiten van *S. macrocarpum* zijn zeldzaam in de internationale plantenregisters in vergelijking met andere soorten binnen het geslacht. De soort zelf wordt door kenners vaak beschreven als "een van de meest aantrekkelijke gele *Sisyrinchium*-soorten" vanwege de relatief grote bloemen met een contrasterende ring. De algemeen bekende cultivars behoren meestal tot andere soorten binnen het geslacht *Sisyrinchium*, zoals *S. angustifolium* ('Lucerne', 'Album'), *S. bellum* ('North Coast', 'E. K. Balls'), *S. striatum* of hybriden als *S. 'Devon Skies'*.

Familie

Sisyrinchium macrocarpum behoort tot de Lissenfamilie, de Iridaceae. Dit is een familie van eenzaadlobbige planten die bekend staat om zijn opvallende bloemen, waaronder veel tuinplanten zoals de Iris, Gladiolen en Krokussen.

Hoogte

De volwassen hoogte van *Sisyrinchium macrocarpum* varieert, maar ligt meestal tussen de 15 en 30 centimeter. De grasachtige bladeren blijven vaak lager, terwijl de bloemstengels de maximale hoogte bereiken.

Bloemkleur

De bloemkleur van *Sisyrinchium macrocarpum* is helder goudgeel, met een opvallende contrasterende, stervormige ring in het centrum die purperbruin tot donkerrood van kleur is. De bloemen zijn groot in vergelijking met veel andere soorten in het geslacht.

Bladkleur

De bladeren zijn smal en grasachtig, lineair van vorm, en hebben een blauwgroene tot grijsgroene kleur. Het loof groeit in dichte pollen en is in milde klimaten bladhoudend (groenblijvend).



Bloeiperiode

De bloeiperiode van deze vaste plant strekt zich uit van de late lente tot de vroege zomer, doorgaans van mei tot en met juli. De bloei is vaak langdurig als uitgebloeide stelen worden verwijderd.

Standplaats

De plant prefereert een standplaats in de volle zon. Een goed doorlatende, matig voedselrijke, lichte tot stenige bodem is ideaal. De grond moet neutraal tot licht kalkrijk zijn. Hoewel de plant droogtetolerant is zodra deze goed is gevestigd, wordt hij het best geplant op een plek waar de bodem licht vochtig, maar zeker niet nat blijft, vooral in de winter om wortelrot te voorkomen.

Herkomst

Sisyrinchium macrocarpum is inheems in Zuid-Amerika, specifiek in het westen van Argentinië (Noordwest en Zuid-Argentinië). Het is een soort die van nature voorkomt in gematigde biomen.

Soort gewas

Het is een overblijvende, kruidachtige vaste plant, ook wel bieslelie of blauwogengras genoemd. De plant heeft een polvormende groeiwijze.

Vermeerderingswijze

De vermeerdering van *Sisyrinchium macrocarpum* kan op twee manieren plaatsvinden: door zaad en door deling van de pollen (wortelstokken/knollen). Zaden kunnen in het vroege voorjaar of de late winter worden gezaaid. Vermeerdering door deling van de pol vindt bij voorkeur plaats in het voorjaar, waarbij de pol wordt opgedeeld in secties met elk een groeipunt.

Klimaatzone

Sisyrinchium macrocarpum wordt over het algemeen als goed winterhard beschouwd. De plant is geschikt voor USDA hardheidszones 5 tot 9. Dit betekent dat de plant temperaturen kan verdragen tot ongeveer -20°C tot -25°C, mits de bodem goed gedraineerd is.

Insecten

Zoals veel bloeiende planten in het geslacht *Sisyrinchium*, is ook *S. macrocarpum* aantrekkelijk voor diverse insecten. De plant staat bekend als bijen- en bestuivervriendelijk. De bloemen trekken bijen en andere nuttige bestuivers aan. De soort is over het algemeen resistent tegen plagen.

Bronvermelding


<https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:441163-1>

<https://darcyeverest.co.uk/product/sisyrinchium-macrocarpum/>

<https://www.tuinadvies.nl/plantengids/9554/sisyrinchium-macrocarpum>

https://www.plant-world-seeds.com/store/view_seed_item/1232/sisyrinchium-macrocarpum-seeds

https://www.picturethisai.com/care/Sisyrinchium_macrocarpum.html



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	Vernoemd door Hieron. (1881); <i>Sisyrinchium</i> (haren jas), <i>macrocarpum</i> (grote vrucht).
Taxonomie	Rijk: Plantae, Orde: Asparagales, Familie: Iridaceae, Geslacht: <i>Sisyrinchium</i> , Soort: <i>S. macrocarpum</i> .
Synoniemen	Geen geaccepteerde taxonomische synoniemen bekend.
Variëteiten en cultivars	Geen specifiek benoemde cultivars van <i>S. macrocarpum</i> bekend in de algemene handel.
Familie	Iridaceae (Lissenfamilie).
Hoogte	Tussen 15 en 30 cm.
Bloemkleur	Helder goudgeel met een purperbruine tot donkerrode, stervormige ring in het centrum.
Bladkleur	Blauwgroen tot grijsgroen.
Bloeiperiode	Late lente tot vroege zomer (mei t/m juli).
Standplaats	Volle zon, goed doorlatende, matig voedselrijke, lichte tot stenige bodem.
Herkomst	West-Argentinië (Noordwest en Zuid-Argentinië).
Soort gewas	Overblijvende, kruidachtige vaste plant.
Vermeerderingswijze	Door zaad of door deling van de pollen/wortelstokken/knollen in het voorjaar.
Klimaatzone	USDA Hardheidszone 5-9.
Insecten	Bijen- en bestuivervriendelijk.