Sternbergia candida x vernalis

Nomenclatuur en Etymologie

Foto: Gert Hoek

De geslachtsnaam *Sternbergia* is vernoemd naar de Boheemse botanicus en mineralenverzamelaar Kaspar Maria von Sternberg (1761–1838). De hybride naam *candida x vernalis* duidt op een kruising tussen de soorten *Sternbergia candida* en *Sternbergia vernalis*.

- *Candida* betekent "wit" in het Latijn, verwijzend naar de witte bloemen van de ene ouderplant.
- *Vernalis* betekent "van de lente", wat aangeeft dat de andere ouderplant een lentebloeier is.

Taxonomie

- Rijk: Plantae
- Klasse: Monocotyledonae
- Orde: Asparagales
- Familie: Amaryllidaceae
- Geslacht: *Sternbergia*
- Hybride: *Sternbergia candida x vernalis*

Synoniemen

Er zijn geen erkende synoniemen voor deze hybride.

Variëteiten en Cultivars

Er zijn momenteel geen geregistreerde variëteiten of cultivars van deze specifieke hybride bekend.

© Nederlandse Rotsplanten Vereniging

Familie

De hybride behoort tot de Amaryllidaceae, een familie die bekend staat om sierlijke bolgewassen met opvallende bloemen.

Hoogte

De plant wordt 10-15 cm hoog, wat haar geschikt maakt voor rotstuinen en borders.

Bloemkleur

De bloemen zijn meestal lichtgeel tot crèmewit, een combinatie van de bloemkleuren van beide oudersoorten.

Bladkleur

De bladeren zijn smal, lineair en donkergroen. Ze verschijnen meestal gelijktijdig met of kort na de bloei.

Bloeiperiode

De bloei vindt plaats in het vroege voorjaar, doorgaans in maart of april, afhankelijk van de klimaatomstandigheden.

Standplaats

De plant prefereert een zonnige plek met goed doorlatende, zanderige grond. Ze groeit goed in rotstuinen en kan ook in potten worden gekweekt.

Herkomst

De hybride is niet in het wild gevonden maar ontstaan door kunstmatige kruising tussen *Sternbergia candida* (inheems in Turkije) en *Sternbergia vernalis* (voorkomend in het oostelijke Middellandse Zeegebied).

Soort Gewas

Het is een winterharde, vaste bolgewas-hybride die geschikt is voor sierbeplanting in mediterrane en gematigde tuinen.

Vermeerderingswijze

- Bollen: De primaire vermeerderingsmethode is via dochterbollen.
- Zaden: Het is mogelijk om zaden te gebruiken, maar hybriden kunnen minder voorspelbaar zijn in zaailingen.

Klimaatzone (USDA-zones)

De hybride is winterhard in USDA-zones 7-9 en vereist bescherming tegen strenge vorst in koudere gebieden.

Insecten

De bloemen trekken bestuivers zoals bijen en vliegen aan. Het nectar- en stuifmeelaanbod is gering, maar voldoende voor kleine insecten.

Bronvermelding

- https://www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/Sternbergia
- https://www.iplantatlas.org/plant/sternbergia

© Nederlandse Rotsplanten Vereniging

Samenvatting

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur	Genoemd naar Kaspar Maria von Sternberg; hybride van *candida* en *vernalis*.
Taxonomie	Plantae, Monocotyledonae, Asparagales, Amaryllidaceae, *Sternbergia candida x vernalis*.
Synoniemen	Geen erkende synoniemen.
Variëteiten en Cultivars	Geen bekende variëteiten of cultivars.
Familie	Amaryllidaceae.
Hoogte	10-15 cm.
Bloemkleur	Lichtgeel tot crèmewit.
Bladkleur	Donkergroen, smal en lineair.
Bloeiperiode	Vroege voorjaar (maart-april).
Standplaats	Zonnig, goed doorlatende grond.
Herkomst	Kunstmatige kruising tussen soorten uit Turkije en het Middellandse Zeegebied.
Soort gewas	Vaste plant, bolgewas.
Vermeerderingswijze	Via dochterbollen en zaden.
Klimaatzone	USDA-zones 7-9.
Insecten	Aantrekkelijk voor kleine bestuivende insecten zoals bijen en vliegen.