



Trillium discolor



Nomenclatuur en Etymologie

De wetenschappelijke naam *Trillium discolor* is afgeleid van het Latijnse *discolor*, wat "verschillend van kleur" betekent. Deze naam verwijst naar de lichte schakering van kleuren in de bloembladen van deze soort, die variëren van crèmekleurig tot lichtgeel.

Taxonomie

- Rijk: Plantae (Planten)
- Klasse: Liliopsida (Eenzaadlobbigen)
- Orde: Liliales
- Familie: Melanthiaceae
- Geslacht: *Trillium*
- Soort: *Trillium discolor*

Synoniemen

Er zijn geen algemeen erkende synoniemen voor *Trillium discolor*.

Variëteiten en Cultivars

Er zijn geen officieel geregistreerde variëteiten of cultivars van *Trillium discolor*. De soort wordt vooral in zijn natuurlijke vorm gekweekt.

Familie

T. discolor maakt deel uit van de Melanthiaceae-familie, een groep van vaste planten die bekendstaan om hun unieke bloemen en voorkeur voor schaduwrijke habitats.

Hoogte

De plant wordt gemiddeld 20 tot 40 cm hoog, afhankelijk van de bodem- en lichtomstandigheden.

Bloemkleur

De bloemen zijn lichtgeel tot crème van kleur. Ze hebben vaak een subtiele tintvariatie en een delicate textuur, wat bijdraagt aan hun sierlijke uiterlijk.

Bladkleur

De bladeren zijn groot, elliptisch van vorm, en donkergroen met een gladde textuur. Soms vertonen de bladeren een licht gevlekte tekening.

Bloeiperiode

T. discolor bloeit in het late voorjaar, meestal in april en mei, afhankelijk van het klimaat en de locatie.

Standplaats

De plant gedijt het beste in een vochtige, humusrijke bodem en geeft de voorkeur aan halfschaduw tot diepe schaduw. Het is een ideale soort voor bostuinen en natuurlijke landschappen.

Herkomst

T. discolor is endemisch in het zuidoosten van de Verenigde Staten, specifiek in de Piedmont-regio van South Carolina en Georgia. Het is een zeldzame soort met een beperkte verspreiding.

Soort Gewas

Dit is een meerjarige, vaste plant die groeit vanuit een wortelstok. De soort wordt vaak gekozen vanwege zijn elegante bloemen en sierlijke uitstraling in natuurlijke tuinen.



Vermeerderingswijze

- Zaden: De plant kan worden vermeerderd door zaden, maar het proces is traag en vereist stratificatie. Het kan meerdere jaren duren voordat de plant bloeit.
- Wortelstokdeling: Een efficiëntere methode is het delen van de wortelstok in de herfst of vroege lente.

Klimaatzone

T. discolor is winterhard in USDA-zones 6-8. Ze verdraagt zachte winters en vochtige zomers, mits in een beschutte en schaduwrijke standplaats.

Insecten

De bloemen trekken vliegen en kevers aan voor bestuiving. De zaden hebben elaiosomen, die mieren aantrekken en zorgen voor verspreiding via myrmecochorie.

Bronvermelding

- https://www.wildflower.org/plants/result.php?id_plant=trdi6
 - <https://temperate.theferns.info/plant/Trillium+discolor>
-

Samenvatting

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur	<i>Trillium discolor</i> , verwijst naar variatie in bloemkleur.
Taxonomie	Plantae, Liliopsida, Liliales, Melanthiaceae, <i>Trillium discolor</i> .
Synoniemen	Geen algemeen erkende synoniemen.
Variëteiten en Cultivars	Geen officiële variëteiten of cultivars.
Familie	Melanthiaceae.
Hoogte	20-40 cm.
Bloemkleur	Lichtgeel tot crème.
Bladkleur	Donkergroen, soms licht gevlekt.
Bloeiperiode	April-mei.
Standplaats	Vochtige, humusrijke bodem; halfschaduw tot diepe schaduw.
Herkomst	Zuidoosten van de VS (South Carolina, Georgia).
Soort gewas	Meerjarige vaste plant.
Vermeerderingswijze	Zaden (traag) of wortelstokdeling (efficiënt).
Klimaatzone	USDA-zones 6-8, winterhard.
Insecten	Bestuiving door vliegen en kevers; zaadverspreiding door mieren.