



Trillium foetidissimum



Nomenclatuur en Etymologie

De wetenschappelijke naam *Trillium foetidissimum* is afgeleid van het Latijnse *foetidus*, wat "stinkend" betekent, met een intensiverend achtervoegsel *-issimum*. Deze naam verwijst naar de onaangename geur die de bloemen van deze soort afgeven, wat helpt bij het aantrekken van specifieke bestuivers.

Taxonomie

- Rijk: Plantae (Planten)
- Klasse: Liliopsida (Eenzaadlobbigen)
- Orde: Liliales
- Familie: Melanthiaceae
- Geslacht: *Trillium*
- Soort: *Trillium foetidissimum*

Synoniemen

Er zijn momenteel geen algemeen erkende synoniemen voor *Trillium foetidissimum*. De soort wordt uitsluitend onder deze naam beschreven.

Variëteiten en Cultivars

Er zijn geen bekende variëteiten of cultivars van *Trillium foetidissimum*. De soort wordt vooral in zijn oorspronkelijke vorm aangetroffen.

Familie

T. foetidissimum behoort tot de familie Melanthiaceae, een groep van vaste planten die vaak in bossen groeien en bekendstaan om hun wortelstokken en sierlijke bloemen.

Hoogte

De plant bereikt een hoogte van 25 tot 45 cm, afhankelijk van de groeiomstandigheden.

Bloemkleur

De bloemen zijn donker purperrood tot bruinachtig van kleur. Ze hebben een leerachtige textuur en een onopvallende, maar karakteristieke geur.

Bladkleur

De bladeren zijn breed, elliptisch en donkergroen. Vaak zijn ze gevlekt met lichtere tinten groen, wat zorgt voor een decoratief uiterlijk.

Bloeiperiode

T. foetidissimum bloeit in het vroege voorjaar, meestal tussen maart en mei. De bloemen blijven gedurende enkele weken aanwezig.

Standplaats

De plant geeft de voorkeur aan lichte tot diepe schaduw en groeit het beste in goed doorlatende, humusrijke grond die vochtig blijft maar niet drassig is. Ze is geschikt voor bostuinen en schaduwrijke perken.

Herkomst

T. foetidissimum is inheems in de zuidoostelijke regio's van de Verenigde Staten. Ze groeit daar in bossen en op vochtige, schaduwrijke plekken.

Soort Gewas

Dit is een meerjarige, vaste plant die groeit vanuit een wortelstok. Ze wordt gewaardeerd om haar unieke bloemkleur en is een bijzondere keuze voor natuurlijke tuinontwerpen.



Vermeerderingswijze

- Zaden: De plant kan worden vermeerderd door zaden, hoewel dit proces traag is en vaak meerdere jaren vereist voordat de plant volwassen wordt.
- Wortelstokdeling: Een meer gebruikelijke methode is het delen van de wortelstok, wat het beste in de herfst of vroege lente kan worden gedaan.

Klimaatzone

T. foetidissimum is winterhard in USDA-zones 6-9. De plant gedijt goed in gematigde klimaten met milde winters en vochtige zomers.

Insecten

De onaangename geur van de bloemen trekt voornamelijk aasvliegen aan, die verantwoordelijk zijn voor de bestuiving. De zaden hebben elaiosomen die mieren aantrekken, wat resulteert in zaadverspreiding via myrmecochorie.

Bronvermelding

- <https://plants.ces.ncsu.edu/plants/trillium-foetidissimum/>
 - <https://temperate.theferns.info/plant/Trillium+foetidissimum>
-

Samenvatting

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur	<i>Trillium foetidissimum</i> , verwijst naar de onaangename geur van de bloemen.
Taxonomie	Plantae, Liliopsida, Liliales, Melanthiaceae, <i>Trillium foetidissimum</i> .
Synoniemen	Geen algemeen erkende synoniemen.
Variëteiten en Cultivars	Geen bekende variëteiten of cultivars.
Familie	Melanthiaceae.
Hoogte	25-45 cm.
Bloemkleur	Donker purperrood tot bruinachtig.
Bladkleur	Donkergroen, vaak gevlekt met lichtere tinten.
Bloeiperiode	Maart-mei.
Standplaats	Lichte tot diepe schaduw, humusrijke, goed doorlatende grond.
Herkomst	Zuidoostelijke Verenigde Staten.
Soort gewas	Meerjarige vaste plant.
Vermeerderingswijze	Zaden (traag) of wortelstokdeling (efficiënter).
Klimaatzone	USDA-zones 6-9, winterhard.
Insecten	Bestuiving door aasvliegen; zaadverspreiding door mieren.