



Tulbaghia galpinii

Nomenclatuur/etymologie

De geslachtsnaam *Tulbaghia* is vernoemd naar Ryk Tulbagh (1699–1771), die gouverneur van de Nederlandse Kaapkolonie was in de 18e eeuw. De soortnaam *galpinii* is een eerbetoon aan Ernest Edward Galpin (1854-1941), een Zuid-Afrikaanse bankier en getalenteerde amateur-botanicus en plantenverzamelaar, die vele Zuid-Afrikaanse soorten heeft verzameld en beschreven.

Taxonomie

Tulbaghia galpinii behoort tot de volgende taxonomische indeling:


- Rijk: Plantae
- Orde: Asparagales
- Familie: Amaryllidaceae (Narcisfamilie)
- Onderfamilie: Allioideae
- Geslacht: *Tulbaghia*
- Soort: *Tulbaghia galpinii*

Synoniemen

De soort *Tulbaghia galpinii* werd voor het eerst beschreven door Friedrich Richard Rudolf Schlechter in 1897 en heeft sindsdien weinig aanvaarde synoniemen gehad. Het wordt consistent onder deze naam erkend.

Variëteiten en cultivars

Er zijn geen bekende, wijdverbreide variëteiten of cultivars van *Tulbaghia galpinii* in de handel. De plant wordt voornamelijk als de botanische soort gekweekt.



Familie

Tulbaghia galpinii behoort tot de familie Amaryllidaceae, oftewel de Narcisfamilie. Dit is een grote familie van eenzaadlobbige planten, waartoe ook uien (*Allium*) en narcissen behoren. Het geslacht *Tulbaghia* werd voorheen vaak ondergebracht bij de Alliaceae of de Liliaceae.

Hoogte

Deze is een van de kleinere soorten in het geslacht. *Tulbaghia galpinii* bereikt een bescheiden hoogte, meestal tussen de 12 en 30 centimeter wanneer volgroeid. De bloemstengels zijn slank en de grasachtige bladeren blijven laag.

Bloemkleur

De bloemen van *Tulbaghia galpinii* zijn groenwit tot lichtroze of lichtpaarsroze. Ze verschijnen in een los scherm (umbel) bovenaan de stengel. De bloemen hebben de voor het geslacht kenmerkende corona, een verhoogde, kroonachtige structuur in het midden van de bloem.

Bladkleur

De bladeren zijn groen of grijsgroen, smal, langwerpig en grasachtig. Bij kneuzing verspreiden ze, net als veel andere *Tulbaghia*-soorten, een lichte knoflookachtige geur.

Bloeiperiode

Tulbaghia galpinii bloeit gedurende een lange periode, van de late lente tot ver in de herfst. De hoofdbloei valt meestal tussen mei en september, afhankelijk van de lokale klimaatomstandigheden en standplaats.

Standplaats

De plant gedijt het beste op een zonnige standplaats. De bodem moet goed doorlatend zijn, bij voorkeur zanderig of steenachtig, en mag vochtig zijn, maar niet drassig, vooral in de winter. Goede drainage is essentieel voor de overleving.

Herkomst

Tulbaghia galpinii is inheems in Zuid-Afrika, waar hij voorkomt in de West-Kaap. Hier groeit hij in droge graslanden en op rotsachtige hellingen.

Soort gewas

Het is een meerjarige, kruidachtige plant die groeit vanuit een ondergrondse wortelstok of bolachtig knolgewas. Het wordt beschouwd als een vaste plant en wordt vaak gebruikt als sierplant.

Vermeerderingswijze

De vermeerdering van *Tulbaghia galpinii* geschiedt voornamelijk door zaad of door scheuring van de wortelstokken. De clusters van bolachtige wortelstokken kunnen gemakkelijk worden gedeeld om nieuwe planten te verkrijgen.



Klimaatzone

Tulbaghia galpinii is, net als veel Zuid-Afrikaanse bolgewassen, matig tot redelijk winterhard. De plant wordt over het algemeen als geschikt beschouwd voor USDA-winterhardheidszones 8 tot 10. In koudere klimaten moet hij in de volle grond winterbescherming krijgen of als kuipplant vorstvrij overwinteren.

Insecten

De bloemen van *Tulbaghia* hebben een milde geur, die bij sommige soorten 's avonds intenser is. De planten trekken bestuivers aan, zoals bijen en vlinders. Sommige soorten *Tulbaghia* worden 's nachts bestoven door nachtvlinders.

Bronvermelding

<https://bihrmann.com/caudiciforms/subs/tul-gal-sub.asp>

<https://www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/Tulbaghia>

<https://www.allesoverbloembollen.nl/bloembollen-soorten/zomerbloeiende-bolgewassen/tulbaghia/>

<https://esveld.nl/a/tulbaghia/>

<https://www.hardy-plant.org.uk/plant/tulbaghia-galpinii>

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	Geslachtsnaam vernoemd naar gouverneur Ryk Tulbagh; soortnaam <i>galpinii</i> vernoemd naar E.E. Galpin.
Taxonomie	Familie: Amaryllidaceae, Geslacht: <i>Tulbaghia</i> , Soort: <i>Tulbaghia galpinii</i> .
Synoniemen	Geen wijdverbreide synoniemen.
Variëteiten en cultivars	Geen bekende, wijdverbreide cultivars.
Familie	Amaryllidaceae (Narcisfamilie).
Hoogte	12 tot 30 centimeter.
Bloemkleur	Groenwit tot lichtroze of lichtpaarsroze.
Bladkleur	Groen of grijsgroen; grasachtig; geurend naar knoflook bij kneuzing.
Bloeiperiode	Mei tot september.
Standplaats	Zonnig; goed doorlatende, zanderige bodem (niet te nat in de winter).
Herkomst	Zuid-Afrika (West-Kaap).
Soort gewas	Meerjarige, kruidachtige plant (bolgewas/wortelstok).
Vermeerderingswijze	Door zaad of door scheuring van de wortelstokken.
Klimaatzone	Matig tot redelijk winterhard (USDA-zones 8 tot 10).
Insecten	Trekt bestuivende insecten aan, zoals bijen en vlinders.