



Viola chaerophylloides

Nomenclatuur/etymologie

De geslachtsnaam *Viola* is afgeleid van het Latijn en betekent 'violet', verwijzend naar de kleur van de bloemen van veel soorten in het geslacht. De soortaanduiding *chaerophylloides* is samengesteld uit twee delen. Het eerste deel, *chaerophyllo*, verwijst naar het geslacht *Chaerophyllum* (Kervel), en het achtervoegsel *-oides* betekent 'gelijkend op'. Dit duidt op de opvallende gelijkenis van het blad van deze viool met het fijn ingesneden, geveerde blad van Kervel of gerelateerde planten uit de schermbloemenfamilie. De plant wordt soms aangeduid als Japans Viooltje.

Taxonomie

Viola chaerophylloides is een soort binnen het geslacht *Viola*, dat deel uitmaakt van de Viooltjesfamilie.

- Rijk: Plantae
- Orde: Malpighiales
- Familie: Violaceae (Viooltjesfamilie)
- Geslacht: *Viola*
- Soort: *V. chaerophylloides*



Foto: Frans IJsselstijn

Synoniemen

Een belangrijk synoniem, dat vaak in botanische en tuinbouwbronnen wordt aangetroffen, is *Viola dissecta* var. *chaerophylloides*. Dit geeft aan dat de plant door sommigen als een variëteit van *Viola dissecta* wordt beschouwd. De plant staat in het Nederlands soms bekend als Japans Viooltje, hoewel dit geen officiële naam is.

Variëteiten en cultivars

Viola chaerophylloides is een meer gespecialiseerde soort die voornamelijk door liefhebbers en gespecialiseerde kwekerijen wordt gehouden. Er zijn weinig cultivars van deze soort bekend in de algemene handel. De meest genoemde en gewaardeerde selectie is *Viola chaerophylloides* 'Beni-Zuru' (foto). Dit is een lilakleurige bloeiende selectie die bekend staat om zijn rijke voorjaarsbloei en aantrekkelijke, fijn ingesneden blad.

Familie

De soort behoort tot de Viooltjesfamilie (Violaceae), een wereldwijd verspreide familie van voornamelijk kruidachtige planten. De familie wordt gekenmerkt door bloemen met vijf kroonbladen, waarbij het onderste kroonblad vaak een spoor vormt.

Hoogte

Dit viooltje is een lage, polvormende vaste plant. De volwassen hoogte ligt over het algemeen tussen de 4 en 20 centimeter, maar is meestal in het lagere segment van 10 tot 15 centimeter.

Bloemkleur

De bloemkleur van de soort is variabel en kan wit, geel, paars, of roze zijn. De cultivar 'Beni-Zuru' is specifiek roze bloeiend. De bloemen zijn vrij klein, met een diameter van ongeveer 2 tot 2,5 centimeter.

Bladkleur

Het blad van de soort is groen. Het onderscheidende kenmerk van *V. chaerophylloides* is echter de bladvorm: het blad is diep ingesneden en fijn geveerd, waardoor het lijkt op het blad van de Kervel (*Chaerophyllum*).

Bloeiperiode

De hoofdbloeiperiode van *Viola chaerophylloides* ligt vroeg in het seizoen, meestal van april tot en met mei. De plant kan incidenteel nabloeien in de loop van het seizoen, vooral als de omstandigheden gunstig zijn.

Standplaats

Deze soort is van nature een bosrandplant en gedijt het beste op een plek met halfschaduw, waar ze wordt beschermd tegen de felle middagzon. Ze verlangt een goed doorlatende, matig voedselrijke, kalkvrije bodem die tijdens het groeiseizoen licht vochtig is. In de winter is een relatief droge standplaats aan te raden.



Herkomst

Viola chaerophylloides is een Oost-Aziatische soort. De plant is inheems in landen zoals Japan, Korea en delen van China. Dit verklaart de soms gebruikte naam Japans Viooltje.

Soort gewas

Het is een meerjarige, kruidachtige vaste plant. Door zijn compacte, polvormende groei is het een geschikte plant voor rotstuinen, borders vooraan, of in potten.

Vermeerderingswijze

De plant kan worden vermeerderd door middel van zaaien, hoewel de zaden vaak een koudebehandeling nodig hebben om te kiemen. Een veelgebruikte methode voor cultivars is vermeerdering door stekken, met name stengelstekken genomen in de lente of zomer, die in een vochtige, goed doorlatende grond worden geplant.

Klimaatzone

De plant is winterhard, maar de tolerantie voor kou kan variëren. Over het algemeen wordt ze beschreven als winterhard tot ongeveer USDA zone 7 (circa -15 graden Celsius). De plant is dus geschikt voor het Nederlandse klimaat, maar kan bij zeer strenge vorst extra bescherming nodig hebben, vooral tegen overmatige wintervochtigheid.

Insecten

Zoals de meeste viooltjes, trekt *Viola chaerophylloides* bestuivende insecten aan, waaronder bijen en hommels. Viooltjes zijn ook belangrijke waardplanten voor de rupsen van Parelmoervlinders. Specifieke interacties met insecten voor deze soort zijn echter minder gedocumenteerd dan voor de Europese viooltjes.

Bronvermelding

<https://www.kwekerijmorningglory.nl/plant/viola-chaerophylloides-beni-zuru-japans-viooltje/>

<https://tuinseizoen.com/viola-dissecta-var-chaerophylloides/>

https://www.picturethisai.com/nl/wiki/Viola_chaerophylloides.html

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	<i>Viola</i> (violet); <i>chaerophylloides</i> (gelijkend op Kervel, vanwege de bladvorm)
Taxonomie	<i>Rijk: Plantae, Familie: Violaceae, Geslacht: Viola, Soort: V. chaerophylloides</i>
Synoniemen	<i>Viola dissecta</i> var. <i>chaerophylloides</i> , Japans Viooltje
Variëteiten en cultivars	'Beni-Zuru'
Familie	Violaceae (Viooltjesfamilie)
Hoogte	4 tot 20 centimeter (meestal 10-15 cm)
Bloemkleur	Variabel: wit, geel, paars, of roze (cultivar 'Beni-Zuru' is roze)
Bladkleur	Groen, diep ingesneden en geveerd
Bloeiperiode	April- mei (hoofdbloei)
Standplaats	Halfschaduw; goed doorlatende, kalkvrije, matig voedselrijke grond
Herkomst	Oost-Azië (Japan, Korea, China)
Soort gewas	Meerjarige, kruidachtige vaste plant (rotstuinplant)
Vermeerderingswijze	Zaaien of stengelstekken
Klimaatzone	Winterhard tot ca. USDA zone 7 (ca. -15 graden Celsius)
Insecten	Trekt bijen, hommels en vlinders aan (waardplant)