



ACIS AUTUMNALIS

NOMENCLATUUR/ETYMOLOGIE

Acis autumnalis, ook wel bekend als de herfstbloeiende sneeuwkllokjes, heeft zijn naam afgeleid van het Griekse *Acis*, een figuur uit de mythologie, en *autumnalis*, dat "herfstbloeiend" betekent, verwijzend naar de bloeitijd van de plant in de late zomer en vroege herfst.

TAXONOMIE

- Rijk: Plantae (planten)
- Klasse: Liliopsida (eenzaadlobbigen)
- Orde: Asparagales
- Familie: Amaryllidaceae (narcisfamilie)
- Geslacht: *Acis*
- Soort: *Acis autumnalis*

SYNONIEMEN

Leucojum autumnale

BESCHRIJVING EN FAMILIE

Acis autumnalis behoort tot de Amaryllidaceae-familie, een familie van bloeiende planten die bekend staan om hun opvallende bloemen en aanpassingsvermogen aan verschillende klimaten. Deze familie omvat veel populaire tuinplanten zoals de narcis (*Narcissus*) en de sneeuwkllokjes (*Galanthus*).

HOOGTE EN BLADKLEUR

Acis autumnalis is een relatief kleine plant die een hoogte bereikt van 10 tot 20 cm. De bladeren zijn smal, lineair en grasachtig, met een frisgroene kleur. Ze verschijnen vaak tegelijk met of net na de bloemen en blijven tot in de winter groen.

BLOEMKLEUR EN BLOEIPERIODE

De bloemen van *Acis autumnalis* zijn klokvormig, delicaat en hangen aan dunne, sierlijke stelen. Ze zijn wit of lichtroze van kleur en hebben zes bloemblaadjes. De bloeiperiode valt in de late zomer tot de herfst, meestal van augustus tot oktober, wat een bijzondere toevoeging is aan de tuin in een tijd waarin veel andere planten hun bloei al hebben beëindigd.

HERKOMST

Acis autumnalis is inheems in het Middellandse Zeegebied, met name in Zuid-Europa en Noord-Afrika. De plant groeit in het wild op rotsachtige hellingen, in graslanden en open bossen. Hij is goed aangepast aan de droge zomers en milde winters van zijn oorspronkelijke habitat.

STANDPLAATS EN VERZORGING

Acis autumnalis gedijt het beste in volle zon tot halfschaduw en heeft een voorkeur voor goed doorlatende, zanderige of rotsachtige grond. De plant is droogtetolerant en vereist weinig water zodra hij is gevestigd. Overmatig water geven kan leiden tot wortelrot, dus een goed doorlatende standplaats is essentieel.

De plant vereist weinig onderhoud en kan het beste met rust gelaten worden zodra hij is gevestigd. Het toevoegen van een lichte bemesting in het voorjaar kan de groei bevorderen, maar is meestal niet noodzakelijk.

VERMEERDERINGSWIJZE

Acis autumnalis kan worden vermeerderd door zaad of door het delen van bollen. Het zaaien van zaad kan een lang proces zijn, aangezien de zaden een koudeperiode nodig hebben om te kiemen en het enkele jaren kan duren voordat de zaailingen bloeien.

Het delen van bollen is een snellere en gemakkelijker methode. Dit kan het beste worden uitgevoerd in het vroege voorjaar of de late herfst, wanneer de plant in rust is. De bollen worden voorzichtig opgegraven en in secties gesneden, waarbij elk deel een gezond wortelstelsel heeft. De gedeelde bollen kunnen vervolgens opnieuw worden geplant.

BRONNEN

- Royal Horticultural Society: *Acis autumnalis*
- Missouri Botanical Garden: *Acis autumnalis*
- Wikipedia: [Acis autumnalis](#)



SAMENVATTING

Kenmerk	Details
Familie	Amaryllidaceae
Synoniem	Leucojum autumnale
Hoogte	10-20 cm
Bloemkleur	Wit of lichtroze
Bladkleur	Frisgroen, smal en grasachtig
Bloeiperiode	Augustus tot oktober
Herkomst	Middellandse Zeegebied (Zuid-Europa, Noord-Afrika)
Vermeerderingswijze	Zaad of deling van bollen