



## ANEMONE DRUMMONDII

### NOMENCLATUUR/ETYMOLOGIE

*Anemone drummondii* is vernoemd naar Thomas Drummond, een Schotse botanicus die in de 19e eeuw planten verzamelde in Noord-Amerika. Het geslacht *Anemone* is afgeleid van het Griekse woord *anemos*, wat "wind" betekent, verwijzend naar de kwetsbaarheid van de bloemen, die lijken te dansen in de wind.

### TAXONOMIE

De taxonomische classificatie van *Anemone drummondii* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Stam: Magnoliophyta (Bedektzadigen)
- Klasse: Magnoliopsida (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Ranunculales
- Familie: Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)
- Geslacht: *Anemone*
- Soort: *Anemone drummondii*

### SYNONIEMEN

Enkele synoniemen voor *Anemone drummondii* zijn *Anemone baldensis* en *Anemone canadensis* var. *drummondii*. Deze namen worden soms gebruikt in oudere literatuur, maar zijn minder gangbaar.

### EVENTUELE VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Er zijn geen erkende variëteiten of cultivars van *Anemone drummondii* bekend. Deze soort komt in het wild voor en wordt meestal niet gecultiveerd in tuinbouw, behalve in gespecialiseerde collecties.

### FAMILIE

*Anemone drummondii* behoort tot de familie Ranunculaceae, ook wel de ranonkelfamilie genoemd. Deze familie omvat veel bekende tuinplanten, waaronder boterbloemen (*Ranunculus*) en monnikskappen (*Aconitum*).

### HOOGTE

*Anemone drummondii* is een relatief lage plant en bereikt doorgaans een hoogte van 15 tot 30 cm. Dit maakt de plant geschikt voor rotsachtige tuinen of als bodembedekker in wilde tuinen.

## BLOEMKLEUR

De bloemen van *Anemone drummondii* variëren van wit tot lichtroze. Ze hebben meestal een enkele rij bloembladen en een prominent geel centrum, wat de bloemen een delicate maar opvallende uitstraling geeft.

## BLADKLEUR

Het blad van *Anemone drummondii* is donkergroen en diep ingesneden, met een typische loofstructuur die lijkt op die van andere leden van het geslacht *Anemone*. De bladeren vormen een aantrekkelijk tapijt wanneer de plant niet in bloei staat.

## BLOEIPERIODE

*Anemone drummondii* bloeit in de late lente tot de vroege zomer, meestal van juni tot juli. De bloemen verschijnen vaak direct na het smelten van de sneeuw in alpine gebieden, waar de plant veel voorkomt.

## STANDPLAATS

Deze plant gedijt goed op zonnige tot licht beschaduwde locaties en geeft de voorkeur aan goed doorlatende, vochtige grond. *Anemone drummondii* groeit vaak in open graslanden, langs bosranden en op berghellingen, waar de bodem rotsachtig of zanderig is.

## HERKOMST

*Anemone drummondii* is inheems in de bergachtige regio's van Noord-Amerika, met name in het westen van de Verenigde Staten en Canada. De plant groeit op grote hoogten in alpine en subalpine gebieden, vaak in rotsachtige of grasachtige terreinen.

## SOORT GEWAS

*Anemone drummondii* is een vaste plant die in het wild voorkomt. Het is een belangrijke soort in alpine ecosystemen, waar het helpt de bodem te stabiliseren en bijdraagt aan de biodiversiteit van bergachtige landschappen.

## VERMEERDERINGSWIJZE

Deze plant wordt meestal vermeerderd door zaad. In de natuur verspreiden de zaden zich door de wind. Voor tuinvermeerdering kan *Anemone drummondii* ook worden verdeeld door wortelstokken in het vroege voorjaar of de late zomer.

## KLIMAATZONE

*Anemone drummondii* is winterhard in USDA-klimaatzones 5 tot 7. De plant is goed aangepast aan koude klimaten en kan overleven in gebieden met harde winters en koele zomers, vooral in bergachtige streken.



## INSECTEN

*Anemone drummondii* trekt diverse bestuivers aan, waaronder bijen en vlinders. Deze insecten spelen een belangrijke rol bij de bestuiving van de bloemen. De plant heeft doorgaans weinig last van plagen, maar kan soms worden bezocht door bladluizen.

## BRONVERMELDING

- [https://www.wildflower.org/plants/result.php?id\\_plant=ANDR](https://www.wildflower.org/plants/result.php?id_plant=ANDR)
- <https://plants.usda.gov/home/plantProfile?symbol=ANDR>
- <https://www.rhs.org.uk/plants/details?plantid=2718>

## SAMENVATTING

Onderwerp	Informatie
<b>Nomenclatuur/Etymologie</b>	<i>Anemone drummondii</i> , vernoemd naar Thomas Drummond, betekent "windbloem" in het Grieks.
<b>Taxonomie</b>	Plantae, Magnoliophyta, Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae, <i>Anemone</i> , <i>Anemone drummondii</i>
<b>Synoniemen</b>	<i>Anemone baldensis</i> , <i>Anemone canadensis</i> var. <i>drummondii</i>
<b>Variëteiten/Cultivars</b>	Geen erkende variëteiten of cultivars bekend
<b>Familie</b>	Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)
<b>Hoogte</b>	15-30 cm
<b>Bloemkleur</b>	Wit tot lichtroze, met een geel centrum
<b>Bladkleur</b>	Donkergroen, diep ingesneden
<b>Bloeiperiode</b>	Juni - juli
<b>Standplaats</b>	Zon tot halfschaduw, vochtige, goed doorlatende grond
<b>Herkomst</b>	Noord-Amerikaanse berggebieden, met name in het westen van de VS en Canada
<b>Soort gewas</b>	Vaste plant, wildgewas
<b>Vermeerderingswijze</b>	Zaad, wortelstokdeling
<b>Klimaatzone</b>	USDA-zones 5-7, winterhard in koude klimaten
<b>Insecten</b>	Aantrekkelijk voor bestuivers zoals bijen en vlinders