



AQUILEGIA VULGARIS 'BLACK BARLOW'

NOMENCLATUUR/ETYMOLOGIE

De wetenschappelijke naam *Aquilegia vulgaris* komt van het Latijnse woord "aquila," wat adelaar betekent. Dit verwijst naar de gelijkenis van de bloemsporen met de klauwen van een adelaar. "Vulgaris" betekent gewoon of alledaags, wat duidt op de brede verspreiding en bekendheid van de soort. De cultivarnaam 'Black Barlow' is een eerbetoon aan de tuindersfamilie Barlow en verwijst naar de donkerpaarse, bijna zwarte kleur van de bloemen, die een onderscheidend kenmerk van deze variëteit is.

TAXONOMIE

De taxonomische indeling van *Aquilegia vulgaris* 'Black Barlow' is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Clade: Angiosperms (Bedektzadigen)
- Clade: Eudicots (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Ranunculales
- Familie: Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)
- Geslacht: *Aquilegia*
- Soort: *Aquilegia vulgaris*
- Cultivar: 'Black Barlow'

SYNONIEMEN

Er zijn geen specifieke synoniemen bekend voor *Aquilegia vulgaris* 'Black Barlow', maar de soortnaam *Aquilegia vulgaris* zelf kent varianten zoals:

- *Aquilegia vulgaris* var. *stellata*
- *Aquilegia vulgaris* var. *nivea*

EVENTUELE VARIËTEITEN

Aquilegia vulgaris kent verschillende variëteiten en cultivars, waarvan 'Black Barlow' een opvallende is vanwege zijn unieke bloemkleur. Andere bekende cultivars zijn bijvoorbeeld:

- *Aquilegia vulgaris* 'Blue Barlow'
- *Aquilegia vulgaris* 'Nora Barlow'

FAMILIE

Aquilegia vulgaris 'Black Barlow' behoort tot de familie *Ranunculaceae*, ook wel de ranonkelfamilie genoemd. Deze familie staat bekend om soorten met aantrekkelijke bloemen en veelal opvallende bloemvormen, zoals ranonkels en anemonen.

HOOGTE

De gemiddelde hoogte van *Aquilegia vulgaris* 'Black Barlow' ligt tussen de 60 en 80 centimeter. De plant groeit rechtop, met lange, slanke stelen die de bloemen boven het loof dragen.

BLOEMKLEUR

De bloemen van 'Black Barlow' zijn diep donkerpaars, bijna zwart van kleur. Deze dubbelbloemige bloemen, zonder sporen, hebben een unieke en dramatische uitstraling die vooral opvalt in borders. De bloemen bestaan uit meerdere lagen van bloemblaadjes, wat de bloem een vol en rozetachtig uiterlijk geeft.

BLADKLEUR

Het blad van *Aquilegia vulgaris* 'Black Barlow' is grijsgroen tot donkergroen van kleur. De bladeren zijn fijngesneden en hebben een drievoudige vorm, wat ze een luchtige en sierlijke uitstraling geeft. De bladeren blijven vaak aantrekkelijk, zelfs nadat de plant is uitgebloeid.

BLOEIPERIODE

De bloei van *Aquilegia vulgaris* 'Black Barlow' vindt plaats van mei tot juni. Gedurende deze periode produceert de plant talrijke bloemen die aantrekkelijk zijn voor bestuivende insecten en een opvallende toevoeging vormen aan de lente- en vroege zomerborder.

STANDPLAATS

De ideale standplaats voor *Aquilegia vulgaris* 'Black Barlow' is een plek met halfschaduw tot volle zon. De plant doet het goed in goed doorlatende grond die vochtig maar niet drassig is. Hij is tolerant ten opzichte van verschillende bodemsoorten, maar heeft een voorkeur voor humusrijke en enigszins kalkhoudende grond.

HERKOMST

De wilde soort *Aquilegia vulgaris* is inheems in Europa, waar hij van nature voorkomt in bossen, graslanden en open plekken. De cultivar 'Black Barlow' is een door veredeling ontstane variëteit, ontwikkeld voor zijn unieke bloemkleur en tuingeschiktheid.

SOORT GEWAS

Aquilegia vulgaris 'Black Barlow' is een vaste plant die jaar na jaar terugkeert. Het is een sierlijke tuinplant die vaak in borders wordt gebruikt vanwege zijn decoratieve waarde. Door zijn hoogte en opvallende bloemen is hij ideaal voor de middelste lagen van een gemengde border.



VERMEERDERINGSWIJZE

De vermeerdering van *Aquilegia vulgaris* 'Black Barlow' kan plaatsvinden door zaad of door het delen van de plant. Zaaïen kan het beste in het najaar of vroege voorjaar, waarbij de zaailingen na het eerste groeiseizoen in de volle grond kunnen worden uitgeplant. Het delen van de plant is ook mogelijk, maar minder gebruikelijk, aangezien zaadvermeerdering de voorkeur heeft voor deze soort.

KLIMAATZONE

Aquilegia vulgaris 'Black Barlow' is geschikt voor klimaatzones 3 tot 8, wat betekent dat de plant winterhard is in een breed scala aan temperatuurschommelingen. Hij kan goed tegen koude winters, maar heeft enige bescherming nodig tegen zeer natte omstandigheden.

INSECTEN

De bloemen van *Aquilegia vulgaris* 'Black Barlow' trekken bestuivende insecten aan, zoals bijen en vlinders. Dit maakt de plant niet alleen aantrekkelijk voor tuiniers, maar ook nuttig voor de bevordering van biodiversiteit in de tuin. Het nectar- en stuifmeelaanbod maakt deze plant een waardevolle bron voor veel insectensoorten tijdens de bloeiperiode.

BRONVERMELDING

- [RHS - Royal Horticultural Society](#)
- [Kew Gardens Plants of the World Online](#)
- [Plant Finder](#)
- [Gardeners' World](#)

SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	"Aquilegia" betekent adelaar, "vulgaris" betekent gewoon. 'Black Barlow' verwijst naar de donkerpaarse kleur en de Barlow-familie.
Taxonomie	Rijk: Plantae; Clade: Angiosperms, Eudicots; Orde: Ranunculales; Familie: Ranunculaceae; Geslacht: Aquilegia; Soort: <i>Aquilegia vulgaris</i> ; Cultivar: 'Black Barlow'
Synoniemen	Geen specifieke synoniemen voor de cultivar 'Black Barlow'.
Variëteiten	Andere cultivars zijn 'Blue Barlow' en 'Nora Barlow'.
Familie	Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)
Hoogte	60-80 cm
Bloemkleur	Donkerpaars, bijna zwart
Bladkleur	Grijsgroen tot donkergroen
Bloeiperiode	Mei tot juni
Standplaats	Halfschaduw tot volle zon, goed doorlatende grond
Herkomst	Europa, gecultiveerde variëteit
Soort gewas	Vaste plant
Vermeerderingswijze	Vermeerdering door zaad of delen
Klimaatzone	Zones 3-8, winterhard
Insecten	Trekt bijen en vlinders aan