



AQUILEGIA VULGARIS

NOMENCLATUUR ETYMOLOGIE

De naam *Aquilegia* komt van het Latijnse "aquila" (adelaar), verwijzend naar de sporen die lijken op adelaarsklauwen. *Vulgaris* betekent "gewoon" of "algemeen", wat duidt op de wijdverspreide aanwezigheid van de soort.

TAXONOMIE

- Rijk: Plantae
- Clade: Angiosperms
- Clade: Eudicots
- Clade: Ranunculales
- Familie: Ranunculaceae
- Geslacht: *Aquilegia*
- Soort: *Aquilegia vulgaris*

SYNONIEMEN

- *Aquilegia atropurpurea*
- *Aquilegia boranthiflora*
- *Aquilegia decipiens*
- *Aquilegia leucantha*

VARIËTEITEN/CULTIVARS

- *Aquilegia vulgaris* var. *stellata*
- *Aquilegia vulgaris* 'Nivea'
- *Aquilegia vulgaris* 'Ruby Port'
- *Aquilegia vulgaris* 'Black Barlow'

FAMILIE

Aquilegia vulgaris behoort tot de familie Ranunculaceae, ook wel bekend als de ranonkelfamilie. Deze familie omvat diverse bloeiende planten zoals boterbloemen en monnikskappen.

HOOGTE

De wilde akelei kan een hoogte bereiken van ongeveer 60 tot 90 centimeter. Het groeit rechtop en vormt een aantrekkelijke, vertakte groeiwijze.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Aquilegia vulgaris* zijn zeer variabel van kleur, variërend van diepblauw en paars tot roze, wit en geel. Sommige cultivars hebben ook tweekleurige bloemen.

BLADKLEUR

De bladeren van *Aquilegia vulgaris* zijn meestal lichtgroen van kleur en hebben een fijn geveerd uiterlijk. Ze vormen een aantrekkelijke achtergrond voor de kleurrijke bloemen.

BLOEIPERIODE

De bloeiperiode van de wilde akelei is meestal in het late voorjaar tot het begin van de zomer, meestal van mei tot juli. Gedurende deze periode produceert de plant overvloedige bloemen die een sierlijke uitstraling geven aan de tuin.

HERKOMST

Aquilegia vulgaris is inheems in Europa en delen van Azië, waar het te vinden is in bossen, graslanden en langs bosranden. Het gedijt goed in vochtige, goed doorlatende grond en heeft de neiging om zich natuurlijk te verspreiden in geschikte habitats.

VERMEERDERINGSWIJZE

De wilde akelei kan worden vermeerderd door middel van zaad, deling of het planten van zaailingen. Zaden kunnen worden geoogst uit rijpe zaaddozen en vervolgens worden gezaaid in het najaar of vroege voorjaar.

INSECTEN

De kleurrijke bloemen van *Aquilegia vulgaris* trekken verschillende bestuivers aan, waaronder bijen, vlinders en zweefvliegen. Deze bestuivers spelen een essentiële rol bij het bevorderen van de bestuiving en het behoud van de biodiversiteit.

BRONNEN

- Royal Horticultural Society: *Aquilegia vulgaris*
- Missouri Botanical Garden: *Aquilegia vulgaris*
- North Carolina State University Extension: *Aquilegia vulgaris*



SAMENVATTING

Kenmerk	Details
Familie	Ranunculaceae
Hoogte	60 - 90 centimeter
Bloemkleur	Variabel: blauw, paars, roze, wit, geel
Bladkleur	Lichtgroen
Bloeiperiode	Mei - Juli
Herkomst	Europa, Azië
Vermeerderingswijze	Zaad, deling, zaailingen
Insecten	Bijen, vlinders, zweefvliegen