



# ARENARIA AGGREGATA

## NOMENCLATUUR ETYMOLOGIE

De naam *Arenaria* komt van het Latijnse "arena", wat zand betekent, verwijzend naar de typische groeiplaatsen van het geslacht. *Aggregata* betekent "samengeklonterd" of "bij elkaar verzameld", waarschijnlijk verwijzend naar de groeivorm van de plant.

## TAXONOMIE

- Rijk: Plantae
- Clade: Angiosperms
- Clade: Eudicots
- Clade: Caryophyllales
- Familie: Caryophyllaceae
- Geslacht: *Arenaria*
- Soort: *Arenaria aggregata*

## SYNONIEMEN

Er zijn geen algemeen erkende synoniemen voor *Arenaria aggregata*.

## VARIËTEITEN CULTIVARS

Er zijn geen bekende variëteiten of cultivars van *Arenaria aggregata*.

## FAMILIE

*Arenaria aggregata* behoort tot de familie Caryophyllaceae, ook wel bekend als de anjerfamilie. Deze familie omvat diverse bloeiende planten, waaronder anjers en muursoorten.

## HOOGTE

De bergzandmuur groeit tot een hoogte van ongeveer 10 tot 20 centimeter. Het vormt een dicht tapijt van kruipende stengels en bladeren, waardoor het een uitstekende bodembedekker is.

## BLOEMKLEUR

De bloemen van *Arenaria aggregata* zijn meestal wit, maar er zijn ook variëteiten met roze of lichtrode bloemen. Ze bloeien overvloedig in de lente en zorgen voor een opvallende vertoning.

## BLADKLEUR

Het blad van de bergzandmuur is meestal groen van kleur en heeft een smalle lancetvormige structuur. Het vormt een dicht bladerdek dat de bodem bedekt en onkruid onderdrukt.

## BLOEIPERIODE

De bloeiperiode van *Arenaria aggregata* valt in het voorjaar, meestal van april tot juni. Gedurende deze periode produceert de plant talrijke bloemen die een aangename geur verspreiden.

## HERKOMST

*Arenaria aggregata* is inheems in bergachtige gebieden van Europa, zoals de Alpen en de Pyreneeën. Het gedijt goed in rotsachtige en goed doorlatende bodems.

## VERMEERDERINGSWIJZE

De bergzandmuur kan worden vermeerderd door middel van zaad, stekken of deling. Zaaien kan het beste gebeuren in het najaar of vroege voorjaar, terwijl stekken het beste worden genomen in de zomer.

## INSECTEN

De bloemen van *Arenaria aggregata* trekken verschillende bestuivers aan, waaronder bijen, vlinders en zweefvliegen. Deze bestuivers spelen een essentiële rol bij het bevorderen van de bestuiving en het behoud van de biodiversiteit.

## BRONNEN

- Royal Horticultural Society: *Arenaria aggregata*
- Missouri Botanical Garden: *Arenaria aggregata*
- North Carolina State University Extension: *Arenaria aggregata*



## SAMENVATTING

Kenmerk	Details
<b>Familie</b>	Caryophyllaceae
<b>Hoogte</b>	10 - 20 centimeter
<b>Bloemkleur</b>	Wit, roze, lichtrood
<b>Bladkleur</b>	Groen
<b>Bloeiperiode</b>	April - juni
<b>Herkomst</b>	Europa (Alpen, Pyreneeën)
<b>Vermeerderingswijze</b>	Zaad, stekken, deling
<b>Insecten</b>	Bijen, vlinders, zweefvliegen