



## ASPHODELINE LIBURNICA

### NOMENCLATUUR/ETYMOLOGIE

De geslachtsnaam *Asphodeline* is afgeleid van het Griekse "asphodelos," wat verwijst naar een plant uit de klassieke oudheid die veel voorkomt in mythen en literatuur. De soortaanduiding *liburnica* verwijst naar de regio Liburnia, een historische streek in de buurt van de Adriatische Zee.

### TAXONOMIE

- Rijk: Plantae
- Clade: Angiosperms
- Clade: Monocots
- Orde: Asparagales
- Familie: Asphodelaceae
- Geslacht: *Asphodeline*
- Soort: *Asphodeline liburnica*

### SYNONIEMEN

*Asphodelus liburnicus*

### VARIËTEITEN/CULTIVARS

Er zijn geen officieel erkende variëteiten of cultivars van *Asphodeline liburnica*.

### FAMILIE

*Asphodeline liburnica* behoort tot de familie Asphodelaceae, een plantenfamilie die voornamelijk voorkomt in Eurazië en Afrika. Deze familie omvat verschillende soorten die zowel in het wild als in cultuur worden gekweekt vanwege hun esthetische en medicinale waarde.

### HOOGTE

De Liburnische affodil kan een hoogte bereiken van ongeveer 60 tot 90 centimeter. Het heeft een rechtopstaande groeiwijze en vormt een dichte cluster van lineaire bladeren aan de basis van de plant.

### BLOEMKLEUR

De bloemen van *Asphodeline liburnica* zijn opvallend en hebben meestal een heldergele kleur. Ze groeien in dichte bloemaren bovenaan de lange, rechtopstaande stengels en trekken bestuivende insecten aan.

## BLADKLEUR

De bladeren van *Asphodeline liburnica* zijn smal, langwerpig en meestal groen van kleur. Ze vormen een aantrekkelijke basis voor de bloeiende stengels en voegen structuur toe aan de plant.

## BLOEIPERIODE

*Asphodeline liburnica* bloeit in het late voorjaar tot de vroege zomer, meestal van mei tot juni, afhankelijk van de groeiomstandigheden en het klimaat.

## HERKOMST

De Liburnische affodil is inheems in delen van Zuidoost-Europa, met name in de regio's rond de Adriatische Zee, waaronder Kroatië en Bosnië en Herzegovina. Het groeit van nature op droge, rotsachtige hellingen en graslanden.

## VERMEERDERINGSWIJZE

*Asphodeline liburnica* kan worden vermeerderd door middel van zaad of door het delen van kluiten. Zaaien gebeurt best in het najaar of in het vroege voorjaar, terwijl het delen van kluiten het beste gebeurt in het voorjaar.

## INSECTEN

De bloemen van *Asphodeline liburnica* trekken bestuivende insecten aan, zoals bijen en vlinders, die helpen bij de bestuiving en het voortbestaan van de plant.

## BRONNEN

- Flora of Croatia - *Asphodeline liburnica*
- The Plant List - *Asphodeline liburnica*



## SAMENVATTING

Kenmerk	Details
<b>Familie</b>	Asphodelaceae (Affodilfamilie)
<b>Hoogte</b>	60 - 90 centimeter
<b>Bloemkleur</b>	Helder geel
<b>Bladkleur</b>	Groen
<b>Bloeiperiode</b>	Mei - juni
<b>Herkomst</b>	Zuidoost-Europa
<b>Vermeerderingswijze</b>	Zaad, delen van kluiten
<b>Insecten</b>	Aantrekkelijk voor bijen en vlinders