



# CYPELLA HERBERTII

## NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

*Cypella herbertii*, vaak aangeduid als "herbertscypella" of "oosterse tulpenbloem", ontleent zijn geslachtsnaam aan het Griekse woord "kyphos," wat "gebogen" betekent, en verwijst naar de vorm van de bloembladen. De soortnaam *herbertii* eert waarschijnlijk een vroege botanicus of plantverzamelaar met de naam Herbert, die mogelijk bijdroeg aan het onderzoek naar deze plant.

## TAXONOMIE

- Klasse: Liliopsida
- Clade: Monocotyledonae
- Orde: Asparagales
- Familie: Iridaceae
- Geslacht: *Cypella*
- Soort: *Cypella herbertii*

## SYNONIEMEN

*Cypella herbertii* staat bekend onder enkele synoniemen:

- *Cypella discolor*
- *Cypella gigantea*

## VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Van *Cypella herbertii* zijn verschillende variëteiten bekend, waaronder:

- *Cypella herbertii* var. *herbertii* – de meest voorkomende variëteit.
- *Cypella herbertii* var. *discolor* – een variëteit met iets meer kleurvariatie op de bloembladen.

## FAMILIE

*Cypella herbertii* behoort tot de Iridaceae-familie, ook wel bekend als de lissenfamilie. Deze familie omvat veel bloeiende planten met sierlijke bloemen, zoals irissen en krokussen.

## HOOGTE

De plant bereikt een hoogte van ongeveer 30 tot 60 centimeter, afhankelijk van de groeiomstandigheden. Hij heeft smalle bladeren die recht omhoog groeien en een sterke verticale structuur aan de plant geven.

## BLOEMKLEUR

De bloemen van *Cypella herbertii* zijn meestal helder geel met een vleugje oranje of bruin bij de basis van de bloembladen. Ze hebben een unieke, orchidee-achtige vorm en bloeien kortstondig, vaak slechts één dag per bloem, maar de plant produceert tijdens de bloeiperiode meerdere opeenvolgende bloemen.

## BLADKLEUR

De bladeren van *Cypella herbertii* zijn groen en smal, langwerpig en zwaardvormig. Ze groeien in waaivorm en blijven meestal rechtop.

## BLOEIPERIODE

De bloeiperiode van *Cypella herbertii* valt in de zomer, meestal van juni tot augustus. Gedurende deze maanden opent de plant nieuwe bloemen die slechts kort bloeien, waardoor de bloeiperiode dynamisch en opvallend is.

## STANDPLAATS

Deze plant geeft de voorkeur aan een zonnige standplaats en goed doorlatende, licht vochtige grond. Hij gedijt goed in beschutte tuinen of rotstuinen en kan ook in potten worden gekweekt, mits hij voldoende zonlicht krijgt.

## HERKOMST

*Cypella herbertii* is inheems in Zuid-Amerika, vooral in landen als Argentinië, Brazilië en Uruguay. Hij groeit daar in graslanden en open plekken en gedijt goed in subtropische klimaten.

## SOORT GEWAS

Het is een overblijvende plant die zichzelf elk seizoen opnieuw uit de wortelstok ontwikkelt. De plant vormt geen invasieve kolonie maar groeit als een zelfstandige pol, wat hem geschikt maakt voor de meeste tuinen.

## VERMEERDERINGSWIJZE

Vermeerdering van *Cypella herbertii* kan plaatsvinden door het delen van de wortelstokken in het voorjaar of door zaaien. Bij voldoende warmte en licht kan de plant zich langzaam verspreiden.

## KLIMAATZONE

*Cypella herbertii* is winterhard in USDA-klimaatzones 8 tot 10. In koelere gebieden kan hij als kuipplant worden gehouden en in de winter worden binnengebracht of worden bedekt met mulch om hem te beschermen tegen vorst.

## INSECTEN

De bloemen van *Cypella herbertii* trekken bestuivende insecten aan, zoals bijen en vlinders. Deze bestuiving draagt bij aan de zaadvorming, hoewel de plant zich meestal verspreidt via wortelstokken.



## BRONVERMELDING

- <https://www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/Cypella>
- <https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=c675>
- <https://www.rhs.org.uk/plants/20236/cypella-herbertii/details>

## SAMENVATTING

Onderwerp	Informatie
<b>Nomenclatuur</b>	"Cypella" verwijst naar gebogen vorm van bloemen; "herbertii" ter ere van botanicus Herbert
<b>Taxonomie</b>	Liliopsida, Monocotyledonae, Asparagales, Iridaceae, <i>Cypella</i> , <i>C. herbertii</i>
<b>Synoniemen</b>	<i>Cypella discolor</i> , <i>Cypella gigantea</i>
<b>Variëteiten/Cultivars</b>	Var. <i>herbertii</i> , var. <i>discolor</i>
<b>Familie</b>	Iridaceae
<b>Hoogte</b>	30-60 cm
<b>Bloemkleur</b>	Geel met oranje of bruine accenten
<b>Bladkleur</b>	Groen, smal en zwaardvormig
<b>Bloeiperiode</b>	Zomer (juni tot augustus)
<b>Standplaats</b>	Volle zon, goed doorlatende grond
<b>Herkomst</b>	Zuid-Amerika (Argentinië, Brazilië, Uruguay)
<b>Soort gewas</b>	Overblijvende plant
<b>Vermeerderingswijze</b>	Wortelstokdeling, zaaien
<b>Klimaatzone</b>	USDA 8-10
<b>Insecten</b>	Aantrekkelijk voor bijen en vlinders