



DRACOCEPHALUM BOTRYOIDES

NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

De naam *Dracocephalum botryoides* komt van het Griekse woord "draco" wat "draak" betekent, en "cephalum", wat "hoofd" betekent. Deze verwijst naar de drakenkopachtige bloemen van de plant. De soortnaam *botryoides* komt van het Griekse "botrys", wat "tros" betekent, en verwijst naar de trosvormige bloeiwijze van de plant.

TAXONOMIE

- Rijk: Plantae (Planten)
- Klasse: Eudicots (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Lamiales
- Familie: Lamiaceae
- Geslacht: *Dracocephalum*
- Soort: *Dracocephalum botryoides*

SYNONIEMEN

Dracocephalum botryoides heeft enkele synoniemen die in de literatuur worden gebruikt:

- *Dracocephalum latifolium*
- *Dracocephalum hyssopifolium*

VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Er zijn geen bekende commerciële cultivars van *Dracocephalum botryoides*. De plant wordt echter wel in verschillende tuinen gekweekt vanwege zijn aantrekkelijke bloemen en geurige bladeren.

FAMILIE

Dracocephalum botryoides behoort tot de familie Lamiaceae, de lipbloemenfamilie, die bekend staat om zijn aromatische en vaak eetbare planten zoals munt, oregano en lavendel.

HOOGTE

Deze plant bereikt een hoogte van 30 tot 60 cm, afhankelijk van de groeiomstandigheden. Hij heeft een compacte vorm met rechtopstaande stelen die bloeien in trosvormige clusters.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Dracocephalum botryoides* zijn meestal violetblauw, hoewel ze soms een lichter paarse tint kunnen hebben. De bloemen zijn buisvormig en groeien in dichte, trosachtige clusters die een opvallende en geurige aanblik bieden.

BLADKLEUR

De bladeren van *Dracocephalum botryoides* zijn groen en lancetvormig. Ze hebben een lichte geur, die kan bijdragen aan de aantrekkingskracht van de plant voor zowel mensen als insecten.

BLOEIPERIODE

Dracocephalum botryoides bloeit doorgaans van de late lente tot de vroege zomer, meestal van mei tot juni. De bloei duurt enkele weken, waardoor de plant een lange periode van visuele aantrekkingskracht biedt.

STANDPLAATS

Deze plant doet het beste in een zonnige tot halfschaduwrijke standplaats en heeft een goed doorlatende bodem nodig. Hij kan goed tegen verschillende grondsoorten, zolang de drainage goed is. *Dracocephalum botryoides* is geschikt voor gematigde klimaten.

HERKOMST

Dracocephalum botryoides is inheems in Zuidwest-Azië en delen van Europa, waaronder de Kaukasus, waar hij groeit in graslanden en bergachtige gebieden op een hoogte van 1000 tot 2000 meter.

SOORT GEWAS

Het is een vaste plant die groeit uit een rizoom, wat betekent dat hij jaar na jaar terugkomt. Het wordt vaak gebruikt in borders, als bodembedekker of als onderdeel van een aromatische tuin.

VERMEERDERINGSWIJZE

De plant kan eenvoudig worden vermeerderd door zaad of door het scheuren van de wortelkluiten. Zaad kan het beste in het vroege voorjaar worden gezaaid, en de plant kan ook in de herfst of de vroege lente worden gedeeld.

KLIMAATZONE

Dracocephalum botryoides is winterhard in USDA-klimaatzones 4 tot 8. Het kan zowel koude winters als gematigde zomertemperaturen verdragen, waardoor het geschikt is voor tuinen in gematigde klimaten.

INSECTEN

De bloemen van *Dracocephalum botryoides* trekken een verscheidenheid aan bestuivende insecten aan, waaronder bijen en vlinders. Het nectar en de geurige bloemen maken het een uitstekende plant voor een insectenvriendelijke tuin.



BRONVERMELDING

- <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:60753-1>
- <https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=280380>
- <https://www.rhs.org.uk/plants/6057/dracocephalum-botryoides/details>

SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	<i>Dracocephalum botryoides</i> , genoemd naar de drakenkopachtige bloemen.
Taxonomie	Rijk: Plantae, Klasse: Eudicots, Orde: Lamiales, Familie: Lamiaceae.
Synoniemen	<i>Dracocephalum latifolium</i> , <i>Dracocephalum hyssopifolium</i> .
Variëteiten	Geen bekende cultivars.
Familie	Lamiaceae (Lipbloemenfamilie).
Hoogte	30 tot 60 cm.
Bloemkleur	Violetblauw, soms lichter paars.
Bladkleur	Groen, lancetvormig, aromatisch.
Bloeiperiode	Late lente tot vroege zomer (mei-juni).
Standplaats	Zonnig tot halfschaduw, goed doorlatende bodem.
Herkomst	Zuidwest-Azië, Kaukasus, bergachtige gebieden.
Soort Gewas	Vaste plant, groeit uit een rizoom.
Vermeerdering	Door zaad of het delen van wortelkluiten.
Klimaatzone	USDA-zones 4 tot 8.
Insecten	Aantrekkelijk voor bijen en vlinders.