



DRACUNCULUS VULGARIS

NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

De naam *Dracunculus vulgaris* komt uit het Latijn, waarbij "dracunculus" letterlijk "kleine draak" betekent, een verwijzing naar de slangen- of draakachtige vorm van de stengel en bloemsteel. De soortaanduiding "vulgaris" betekent "algemeen voorkomend" of "gewoon", hoewel de plant zelf nogal exotisch oogt.

TAXONOMIE

- Rijk: Plantae (Planten)
- Klasse: Monocots (Eenzaadlobbigen)
- Orde: Alismatales
- Familie: Araceae
- Geslacht: *Dracunculus*
- Soort: *Dracunculus vulgaris*

SYNONIEMEN

Enkele synoniemen van *Dracunculus vulgaris* zijn:

- *Arum dracunculus*
- *Dracunculus creticus*

VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Dracunculus vulgaris kent geen commerciële cultivars of variëteiten. Het uiterlijk en de exotische verschijning blijven consistent binnen deze soort, hoewel de plant soms licht kan variëren in kleurintensiteit van de bloem en het blad.

FAMILIE

Deze plant behoort tot de familie Araceae, die bekendstaat om planten met opvallende bloeiwijzen zoals calla's en anthuriums, vaak met een opvallend schutblad.

HOOGTE

Dracunculus vulgaris bereikt een hoogte van 1 tot 1,5 meter. De opvallende bloeiwijze en de stevige steel maken hem tot een visueel dominante plant in de tuin.

BLOEMKLEUR

De bloeiwijze bestaat uit een donkere, purperrode schutblad dat een donkere, bijna zwarte bloeikolf omgeeft. De contrasterende kleuren van het schutblad en de bloeikolf maken deze plant zeer opvallend en uniek.

BLADKLEUR

Het blad is donkergroen en diep ingesneden, wat de plant een tropische en decoratieve uitstraling geeft. De bladeren hebben soms een zilverachtig patroon of vlekken.

BLOEIPERIODE

De bloeiperiode van *Dracunculus vulgaris* ligt in het late voorjaar tot de vroege zomer, meestal rond mei en juni. De bloem is kortlevend, maar zeer opvallend tijdens deze periode.

STANDPLAATS

Deze plant gedijt het beste op een halfschaduwrijke plek in goed doorlatende, humusrijke grond. Hoewel hij zon kan verdragen, zorgt enige schaduw ervoor dat de plant niet uitdroogt en optimaal kan bloeien.

HERKOMST

Dracunculus vulgaris is inheems in de Balkan, Griekenland, en het oostelijke Middellandse Zeegebied. Hij groeit hier in open, rotsachtige gebieden en langs bosranden.

SOORT GEWAS

Het is een vaste plant die winterhard is in gematigde klimaten. *Dracunculus vulgaris* wordt vaak toegepast in sierborders of als accentplant in exotische tuinontwerpen.

VERMEERDERINGSWIJZE

De plant kan worden vermeerderd door het delen van knollen, een eenvoudige manier om de soort te verspreiden. Zaaïen is ook mogelijk, hoewel de plant langzaam groeit en het enige jaren kan duren voordat hij bloeit.

KLIMAATZONE

Dracunculus vulgaris is winterhard in USDA-klimaatzones 6 tot 9. In koudere klimaten kan de knol overwinteren mits hij voldoende bedekt wordt om vorstschade te voorkomen.

INSECTEN

De plant trekt insecten aan met zijn bijzondere geur, die doet denken aan rottend vlees. Deze geur dient om aasvliegen aan te trekken, die de bestuiving van de plant mogelijk maken. Dit is een aanpassing aan zijn natuurlijke omgeving waar specifieke bestuivers schaars zijn.

BRONVERMELDING

- <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:86701-1>
- <https://www.rhs.org.uk/plants/6015/dracunculus-vulgaris/details>
- <https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=279920>



SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	<i>Dracunculus vulgaris</i> , wat "kleine draak" betekent.
Taxonomie	Rijk: Plantae, Klasse: Monocots, Orde: Alismatales, Familie: Araceae.
Synoniemen	<i>Arum dracunculus</i> , <i>Dracunculus creticus</i> .
Variëteiten	Geen commerciële variëteiten of cultivars.
Familie	Araceae (Aronskelkfamilie).
Hoogte	1 tot 1,5 meter.
Bloemkleur	Donker purper met zwarte bloeikolf.
Bladkleur	Donkergroen met soms zilverachtige vlekken.
Bloeiperiode	Laat voorjaar tot vroege zomer.
Standplaats	Halfzonnig tot halfschaduw, goed doorlatende, humusrijke grond.
Herkomst	Balkan, Griekenland en het oostelijke Middellandse Zeegebied.
Soort Gewas	Winterharde vaste plant.
Vermeerdering	Door deling van knollen of zaaien.
Klimaatzone	USDA-zones 6 tot 9.
Insecten	Trekt aasvliegen aan met een geur van rottend vlees voor bestuiving.