



EUCOMIS VANDERMERWEI

FOTO: PIET KOK



NOMENCLATUUR/ETYMOLOGIE:

Eucomis komt van het Griekse "eu" (goed) en "komos" (kam), verwijzend naar de kamvormige bladstructuur aan de top van de bloeiwijze.

Vandermerwei eert de Zuid-Afrikaanse plantkundige Dr. I.J. van der Merwe, die betrokken was bij de studie van de Zuid-Afrikaanse flora.

TAXONOMIE:

- Rijk: Plantae
- Stam: Angiosperms
- Klasse: Monocots
- Orde: Asparagales
- Familie: Asparagaceae
- Geslacht: *Eucomis*
- Soort: *Eucomis vandermerwei*

SYNONIEMEN:

Geen algemeen erkende synoniemen voor deze soort.

EVENTUELE VARIËTEITEN

Er zijn geen specifieke variëteiten van **Eucomis vandermerwei** officieel geregistreerd. Kwekers kunnen echter selecties maken die variëren in bloemkleur of -grootte, maar deze worden meestal niet als aparte variëteiten erkend.

FAMILIE

De **Asparagaceae**-familie omvat een breed scala aan planten, waaronder eetbare soorten zoals asperges en sierplanten zoals de ananasplant. Het geslacht **Eucomis** wordt gewaardeerd om zijn unieke bloemen die lijken op een ananas, wat de plant een opvallende verschijning maakt in tuinen.

HOOGTE

Eucomis vandermerwei is een compacte plant die meestal een hoogte bereikt van slechts 15 tot 30 centimeter. Deze kleine gestalte maakt de plant geschikt voor rotstuinen, borders en potten.

BLOEMKLEUR

De bloemen van **Eucomis vandermerwei** zijn opvallend en variëren van dieprood tot purper, vaak met een donkerder centrum. Deze intense kleur maakt de plant een opvallende toevoeging aan elke tuin.

BLADKLEUR

De bladeren van **Eucomis vandermerwei** zijn breed en riemvormig, meestal groen met opvallende paarse vlekken of strepen. Deze decoratieve bladeren dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de plant, zelfs wanneer deze niet in bloei staat.

BLOEIPERIODE

Eucomis vandermerwei bloeit meestal in de late zomer, van augustus tot september. De bloei kan enkele weken duren, afhankelijk van de groeiomstandigheden en het klimaat.

STANDPLAATS

Deze plant gedijt het beste op een zonnige tot halfschaduwrijke standplaats. Een goed doorlatende bodem is essentieel om te voorkomen dat de bollen gaan rotten. **Eucomis vandermerwei** is ook geschikt voor potcultuur, waardoor hij gemakkelijk kan worden verplaatst indien nodig.

HERKOMST

Eucomis vandermerwei is inheems in Zuid-Afrika, specifiek in de Drakensbergen. Het groeit in het wild op graslanden en rotsachtige heuvels, vaak in gebieden die seizoensgebonden nat zijn.

SOORT GEWAS

Het is een meerjarig bolgewas dat elk jaar opnieuw uit de ondergrondse bol groeit. De bol slaat voedingsstoffen op waardoor de plant de winter kan overleven en in de lente weer kan uitlopen.



VERMEERDERINGSWIJZE

Eucomis vandermerwei kan worden vermeerderd door zaad of door het scheuren van de bollen. De zaden worden meestal in het voorjaar gezaaid, terwijl de bollen kunnen worden gedeeld tijdens de rustperiode in de winter.

KLIMAATZONE

Deze plant is winterhard in USDA-zones 7 tot 10. In koudere klimaten moeten de bollen worden uitgegraven en opgeslagen op een vorstvrije plaats gedurende de winter.

INSECTEN

Eucomis vandermerwei trekt bestuivers zoals bijen en vlinders aan, wat bijdraagt aan de biodiversiteit in de tuin. De plant heeft over het algemeen weinig last van plagen, hoewel slakken soms de bladeren kunnen beschadigen.

BRONVERMELDING

- [Eucomis vandermerwei Nomenclature](#)
- Eucomis Cultivation and Care
- PlantZAfrica

SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	Eucomis vandermerwei
Etymologie	"Eucomis" (mooi haar), "vandermerwei" (vernoemd naar Gerrit van der Merwe)
Taxonomie	Rijk: Plantae, Stam: Tracheophyta, Klasse: Magnoliopsida, Orde: Asparagales, Familie: Asparagaceae
Synoniemen	Geen algemeen erkende synoniemen
Variëteiten	Geen officiële variëteiten
Familie	Asparagaceae
Hoogte	15-30 cm
Bloemkleur	Dieprood tot purper met donkerder centrum
Bladkleur	Groen met paarse vlekken of strepen
Bloeiperiode	Augustus - September
Standplaats	Zonnig tot halfschaduw, goed doorlatende bodem
Herkomst	Zuid-Afrika, Drakensbergen
Soort gewas	Meerjarig bolgewas
Vermeerderingswijze	Zaad, scheuren van bollen
Klimaatzone	USDA-zones 7-10
Insecten	Trekt bijen en vlinders aan, gevoelig voor slakken