



VIOLA TRICOLOR SUBSP. CURTISII

NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

Viola tricolor subsp. curtisii, ook wel bekend als het duinviooltje, is een ondersoort van *Viola tricolor*, het bekende driekleurig viooltje. De naam *Viola* verwijst naar het viooltje, een geslacht dat wereldwijd voorkomt. De soortaanduiding *tricolor* betekent "driekleurig", verwijzend naar de drie kleuren die vaak in de bloemen aanwezig zijn. De ondersoortnaam *curtisii* eert de Britse botanicus William Curtis, die veel heeft bijgedragen aan de studie van planten in de Britse eilanden.

TAXONOMIE

De taxonomische indeling van *Viola tricolor subsp. curtisii* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Clade: Angiospermae (Bedektzadigen)
- Clade: Eudicotyledons (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Malpighiales
- Familie: Violaceae (Viooltjesfamilie)
- Geslacht: *Viola*
- Soort: *Viola tricolor*
- Ondersoort: *Viola tricolor subsp. curtisii*

SYNONIEMEN

Een bekend synoniem van *Viola tricolor subsp. curtisii* is:

- *Viola curtisii*

Hoewel *Viola curtisii* soms nog in de literatuur wordt gebruikt, is het officieel geclassificeerd als een ondersoort van *Viola tricolor*.

VARIËTEITEN

Er zijn geen erkende variëteiten van *Viola tricolor subsp. curtisii*. Deze ondersoort wordt specifiek gedefinieerd door zijn natuurlijke habitat en kenmerken, zonder verdere onderverdeling in variëteiten.

FAMILIE

Viola tricolor subsp. curtisii behoort tot de familie Violaceae. Deze familie omvat een grote verscheidenheid aan soorten, die vooral bekend staan om hun sierwaarde in tuinen en natuurlijke habitats.

HOOGTE

De plant bereikt een hoogte van ongeveer 5 tot 15 centimeter. Het is een lage, kruipende plant die zich vaak verspreidt over een breed gebied, wat hem geschikt maakt voor bodembedekking in zandige gebieden.

BLOEMKLEUR

De bloemen zijn driekleurig, meestal met een combinatie van paars, geel en wit. De bloemen van deze ondersoort zijn iets kleiner dan die van de typische *Viola tricolor*, maar ze hebben hetzelfde aantrekkelijke kleurpatroon.

BLADKLEUR

De bladeren zijn donkergroen en lancetvormig, met een enigszins getande rand. Ze vormen een rozet aan de basis van de plant en blijven laag bij de grond.

BLOEIPERIODE

Viola tricolor subsp. curtisii bloeit van april tot augustus. In deze periode is de plant rijkelijk bedekt met bloemen, die aantrekkelijk zijn voor zowel insecten als mensen.

STANDPLAATS

De plant komt vooral voor op zandige, voedselarme gronden en groeit goed in volle zon. Het duinviooltje is een typische soort van kustgebieden, waar het vaak wordt aangetroffen in de duinen. Het gedijt ook in droge, schrale graslanden.

HERKOMST

Viola tricolor subsp. curtisii is inheems in Europa, vooral langs de kust van West-Europa. Hij komt voor in de duinen van landen als Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het is een typische plant van kustlandschappen.

SOORT GEWAS

Viola tricolor subsp. curtisii is een meerjarige plant, maar wordt vaak als eenjarige behandeld omdat hij onder de zware omstandigheden van de duinen snel bloeit en zaad zet. De plant is goed aangepast aan arme bodems en extreme weersomstandigheden, zoals droge zomers en winderige kustgebieden.

VERMEERDERINGSWIJZE

De plant vermenigvuldigt zich voornamelijk door zaden, die door de wind of insecten worden verspreid. In natuurlijke omstandigheden kan hij zich snel vestigen en verspreiden in geschikte habitats. De zaden kunnen ook door mieren worden verspreid (myrmecochorie).



KLIMAATZONE

Viola tricolor subsp. curtisii is winterhard in USDA-klimaatzones 6 tot 8. Hij kan matige kou verdragen en is goed aangepast aan de wisselende omstandigheden van kustgebieden, waaronder koude winters en warme, droge zomers.

INSECTEN

De bloemen van *Viola tricolor subsp. curtisii* trekken verschillende soorten bestuivende insecten aan, zoals bijen en vlinders. Door zijn lange bloeiperiode en opvallende bloemen is het een belangrijke nectarbron in zijn natuurlijke omgeving.

BRONVERMELDING

- Plants of the World Online – *Viola tricolor subsp. curtisii*
 - Flora of Britain – *Viola curtisii*
 - USDA Plant Database – *Viola tricolor*
-

SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	Vernoemd naar botanicus William Curtis, deel van het geslacht <i>Viola</i>
Taxonomie	Rijk: Plantae, Clade: Eudicotyledons, Orde: Malpighiales, Familie: Violaceae
Synoniemen	<i>Viola curtisii</i>
Variëteiten	Geen erkende variëteiten
Familie	Violaceae (Viooltjesfamilie)
Hoogte	5-15 cm
Bloemkleur	Driekleurig: paars, geel en wit
Bladkleur	Donkergroen, lancetvormig
Bloeiperiode	April tot augustus
Standplaats	Zandige, voedselarme gronden, volle zon, kustgebieden
Herkomst	Inheems in West-Europa, vooral langs kustlijnen
Soort gewas	Meerjarige plant, soms als eenjarige behandeld
Vermeerderingswijze	Zaden, verspreid door wind of insecten
Klimaatzone	USDA-zones 6 tot 8
Insecten	Aantrekkelijk voor bijen en vlinders