



VISCARIA VULGARIS

NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

Viscaria vulgaris, ook wel bekend als "teer vingerhoedskruid" of "klimmende akkerkruid", ontleent zijn naam aan het Latijnse woord *viscum*, wat kleverig betekent, verwijzend naar de kleverige stengels van de plant. *Vulgaris* betekent "algemeen" of "gewoon", wat vaak wordt gebruikt om aan te geven dat een soort wijdverbreid voorkomt.

TAXONOMIE

De taxonomische indeling van *Viscaria vulgaris* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Clade: Angiospermae (Bedektzadigen)
- Clade: Eudicotyledons (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Caryophyllales
- Familie: Caryophyllaceae (Anjerfamilie)
- Geslacht: *Viscaria*
- Soort: *Viscaria vulgaris*

SYNONIEMEN

Viscaria vulgaris staat ook bekend onder enkele andere botanische namen:

- *Lychnis viscaria*
- *Silene viscaria*

Deze synoniemen worden vaak nog gebruikt in literatuur en tuinbouw, afhankelijk van de bron.

VARIËTEITEN

Er zijn geen algemeen erkende variëteiten van *Viscaria vulgaris*. De plant komt echter voor in verschillende natuurlijke vormen, afhankelijk van de regio waar hij groeit, met subtiele variaties in bloemkleur en groeigedrag.

FAMILIE

De plant behoort tot de Caryophyllaceae, ofwel de anjerfamilie. Deze familie omvat veel kruidachtige planten die vaak voorkomen in gematigde streken. Kenmerkend voor deze familie zijn de vijfbladige bloemen en de tegenoverstaande bladeren.

HOOGTE

Viscaria vulgaris bereikt een hoogte van ongeveer 30 tot 60 centimeter, afhankelijk van de groeicondities. De stengels zijn dun en rechtopstaand, wat bijdraagt aan de sierlijke uitstraling van de plant.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Viscaria vulgaris* zijn meestal felroze tot paarsroze. De bloemen hebben vijf bloemblaadjes en worden in losse trossen aan de top van de stengels gedragen. De kleur van de bloemen maakt de plant opvallend in de late lente en vroege zomer.

BLADKLEUR

De bladeren van *Viscaria vulgaris* zijn smal, lancetvormig en donkergroen van kleur. Ze staan tegenover elkaar aan de stengel en vormen een mooi contrast met de felgekleurde bloemen.

BLOEIPERIODE

De bloei vindt plaats van mei tot juli. Tijdens deze periode bedekken de bloemen de plant en trekken ze insecten aan die voor bestuiving zorgen.

STANDPLAATS

Viscaria vulgaris gedijt goed op zonnige tot halfschaduwrijke plekken. Hij heeft een voorkeur voor goed doorlatende, kalkrijke grond. De plant komt vaak voor in graslanden, bermen, rotsachtige gebieden en open bossen, waar de bodem niet te vochtig is.

HERKOMST

Viscaria vulgaris is inheems in Europa en Azië, met een verspreidingsgebied dat zich uitstrekt van Scandinavië tot de Middellandse Zee en van West-Europa tot in Centraal-Azië. De plant komt vaak voor in bergachtige streken, waar hij op stenige en droge bodems groeit.

SOORT GEWAS

Dit is een overblijvende kruidachtige plant, wat betekent dat hij elk jaar opnieuw uit zijn wortelstelsel groeit. De plant kan meerdere jaren overleven en is goed aangepast aan droge, stenige habitats.

VERMEERDERINGSWIJZE

Viscaria vulgaris kan vermeerderd worden door zaden, die in de late zomer of herfst kunnen worden geogst en in het voorjaar gezaaid. Ook kan hij vermeerderd worden door de plant te delen in de herfst of het vroege voorjaar.

KLIMAATZONE

De plant is winterhard en kan groeien in USDA-klimaatzones 3 tot 8. Dit maakt hem geschikt voor een breed scala aan klimaten, van koude winters tot relatief warme zomers.



INSECTEN

De bloemen van *Viscaria vulgaris* trekken verschillende bestuivende insecten aan, waaronder bijen, vlinders en zweefvliegen. Door de kleverige stengels kunnen sommige insecten vast komen te zitten, hoewel dit geen primaire functie van de plant lijkt te zijn.

BRONVERMELDING

- Plants of the World Online – *Viscaria vulgaris*
 - Royal Horticultural Society – *Viscaria*
 - USDA Plant Database – *Viscaria vulgaris*
-

SAMENVATTING

| Onderwerp | Beschrijving |
|----------------------------|--|
| Nomenclatuur | Naam verwijst naar kleverige stengels, <i>vulgaris</i> betekent algemeen |
| Taxonomie | Rijk: Plantae, Clade: Eudicotyledons, Orde: Caryophyllales, Familie: Caryophyllaceae |
| Synoniemen | <i>Lychnis viscaria</i> , <i>Silene viscaria</i> |
| Variëteiten | Geen erkende variëteiten |
| Familie | Caryophyllaceae (Anjerfamilie) |
| Hoogte | 30-60 cm |
| Bloemkleur | Felroze tot paarsroze |
| Bladkleur | Donkergroen, lancetvormig |
| Bloeiperiode | Mei tot juli |
| Standplaats | Zonnig tot halfschaduw, goed doorlatende, kalkrijke grond |
| Herkomst | Inheems in Europa en Azië |
| Soort gewas | Overblijvende kruidachtige plant |
| Vermeerderingswijze | Zaden of deling |
| Klimaatzone | USDA-zones 3 tot 8 |
| Insecten | Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en zweefvliegen |